



**Kompleksowa
obsługa rolnictwa**

2021 KATALOG
DOBREGO AGRONOMA



Środki ochrony roślin • Nawozy • Materiał siewny • Zboża





Szanowni Klienci,

Zapraszamy do zapoznania się z Katalogiem Dobrego Agronoma 2021.

W Katalogu przedstawiamy naszą ofertę produktową – środki ochrony roślin, nawozy i inne produkty do produkcji rolnej. Katalog Dobrego Agronoma zawiera przede wszystkim preparaty z handlu równoległego, cieszące się nieustanną popularnością i zaufaniem Klientów. Posiadamy ponad siedemdziesiąt preparatów zarejestrowanych w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywnych i stale poszerzamy nasze portfolio.

Nowościami, do których chcemy Państwa zachęcić są rejestracje własne Rudnikagro. Jesteśmy właścicielem i producentem fungicydów Hogibis 450 EC i Prank 450 EC (str.13, 20) oraz herbicydu Tarracco® 700 SC (str. 30, 32).

20 lat działalności Rudnikagro jest dowodem dużego zaufania, jakim darzą firmę nasi Kontrahenci, a to daje nam największą satysfakcję. Współpraca z producentami rolnymi i firmami handlowymi, zaopatrywanie ich w nawozy i środki do produkcji rolnej, skup płodów rolnych to nasza codzienność, ale i możliwość doskonalenia świadczonych usług.


Dzięki Państwu realizujemy wyzwania, jakie stawia przed nami branża agro i to dla Was stale się rozwijamy.

Zapraszamy do współpracy,


Prezes Zarządu
Mariusz Rudnicki

Rudnikagro Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
tel.: 91 461 25 64
e-mail: info@rudnikagro.pl
www.rudnikagro.pl
www.sklep.rudnikagro.pl


Proponowane zabiegi agrotechniczne w pszenicy ozimej



Proponowane zabiegi agrotechniczne w rzepaku



Proponowane zabiegi agrotechniczne w buraku cukrowym



Fungicydy
 Herbicydy
 Insektycydy
 Zaprawy
 Regulatory wzrostu
 Produkty dodatkowe
 j - jesień w - wiosna



Fungicydy



Herbicydy



Insektycydy



Regulatory wzrostu



Zaprawy



Zboża i materiał siewny



Nawozy



Acador Plus to fungicyd, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime
Substancja aktywna	fluksapyroksad 41,6 g/l, epoksykonazol 41,6 g/l, piraklostrobina 66,6 g/l
Zwalczane choroby	łamliwość źdźbła zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, rdza brunatna, brunatna plamistość liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia rynchosporioza zbóż
Dawka	2l/ha

*produkt zawiera epoksykonazol, sprzedawany do 1 marca 2021.

Apron-X 190 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	protiokonazol 100 g/l, fluoksastrobina 50 g/l, biksafen 40 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
Dawka	1,0–1,25l/ha

Acador Plus*

Produkt referencyjny
Adexar Plus



Apron-X 190 EC

Produkt referencyjny
Variano Xpro 190 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Arbiter 520 EC

Produkt referencyjny
Wirtuoz 520 EC



Arbiter 520 EC jest środkiem grzybobójczym w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu spryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień jary
Substancja aktywna	prochloraz 320g/l, tebukonazol 160g/l, proquinazid 40 g/l
Zwalczane choroby	brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, łamliwość źdźbła, mączniak prawdziwy, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew. Arbiter 520 EC ogranicza występowanie czerni kłosów, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż plamistość siatkowa liści, rdza kątowa
Dawka	0,75–1,25l/ha

Areva 200 EC

Produkt referencyjny
Vertisan 200 EC



Areva 200 EC to środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, węglbnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień jary
Substancja aktywna	pentiopyrad 200g/l
Zwalczane choroby	brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Dawka	1l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Bolero 500 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, burak ćwikłowy
Substancja aktywna	fluazydam 500g/l
Zwalczane choroby	alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy), alternarioza naci marchwi, alternarioza naci pietruszki, alternarioza buraka (liście)
Dawka	0,2–0,4l/ha

Caspara 400 SC Fungicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

Roślina chroniona	truskawka (uprawa w polu i pod osłonami), wiśnia, sałata głowiasta, sałata liściowa (uprawa w polu i pod osłonami), uprawy małobosz (koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak, rośliny przyprawowe)
Substancja aktywna	izofetamid 400g/l
Zwalczane choroby	szara pleśń, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, zgnilizna twardzikowa
Dawka	0,9–1,2l/ha

Bolero 500 SC

Produkt referencyjny
Banjo 500 SC



Caspara 400 SC

Produkt referencyjny
Kenja 400 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Dedal 497 SC*

Produkt referencyjny
Duet Ultra 497 SC



Dedal 497 SC jest środkiem grzybobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, jęczmienia jarego i buraka cukrowego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, burak cukrowy
Substancja aktywna	tiofanat metylowy 310 g/l, epoksykonazol 187 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń kłosów, rdza jęczmienna, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, chwościk buraka, mączniak prawdziwy, brunatna plamistość liści, rdza buraka
Dawka	0,5-0,6l/ha

*produkt zawiera epoksykonazol, sprzedaz mozliwa do 1 marca 2021.

Demeter 250 SC

Produkt referencyjny
Tazer 250 SC



Demeter 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy kukurydza, ziemniak, fasola, kalafior, brokuł, pomidor
Substancja aktywna	azoksystrobina 250 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, czerń zbóż, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, alternarioza, rizoktonioza ziemniaka, rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, antraknoza fasoli, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora
Dawka	0,5-3l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Eldorado to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime, pszenżyto ozime
Substancja aktywna	benzowindyflupyr 75g/l, protiokonazol 150 g/l
Zwalczane choroby	rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia.
Dawka	1l/ha

Graviole 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną jabłek, gorzką zgnilizną gruszek oraz mokrą zgnilizną gruszek. Środek GRAVIO-LE 38 WG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Roślina chroniona	jabłoni i grusza – choroby przechowalnicze
Substancja aktywna	boskalid 25,2% (252 g/kg), piraklostrobina 12,8% (128 g/kg)
Zwalczane choroby	gorzka zgnilizna jabłek, gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek.
Dawka	0,8kg/ha

Eldorado

Produkt referencyjny
Elatus Era



Graviole 38 WG

Produkt referencyjny
Bellis 38 WG



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Hogibis 450 EC Prank 450 EC

rejestracja własna
Rudnikagro



Prima Duo 450 EC

Produkt referencyjny
Atak 450 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Hogibis 450 EC i Prank 450 EC fungicydy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wstępnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, rzepak ozimy i jary
Substancja aktywna	prochloraz 450g/l
Zwalczane choroby	choroby łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza liści, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Dawka	1l/ha

Prima Duo 450 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu wstępnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż ozimych i jarych oraz rzepaku ozimego przed chorobami grzybowymi.

Środki przeznaczone do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, rzepak ozimy i jary
Substancja aktywna	prochloraz 450g/l
Zwalczane choroby	choroby łamliwość źdźbła zbóż, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza liści, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Dawka	1l/ha

Preiner jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	piraklostrobina 150 g/l, fluksapyroksad 75 g/l
Zwalczane choroby	brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, rdza brunatna żyta,
Dawka	0,75-1,5l/ha

Revolte 250 SC Fungicyd, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancja czynna mandipropamid należy do grupy FRAC 40.

Roślina chroniona	ziemniak, pomidor, szpinak, botwina, burak liściowy, uprawy małoobsz (pomidor, oberżyna (baktażan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach, brokuł, kalafior, kapusta brukselska uprawiane w polu, cukinia uprawiana pod osłonami i w szklarniach i wiele innych)
Substancja aktywna	mandipropamid 250g/l
Zwalczane choroby	zaraza ziemniaka (nać i bulwy), mączniak rzekomy, fytoftoroza
Dawka	0,6l/ha, wyjątek cykoria i chmiel – patrz etykieta

Preiner

Produkt referencyjny
Priaxor



Revolte 250 SC

Produkt referencyjny
Revus 250 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rodeo 50 EW

Produkt referencyjny
Kendo 50 EW



Rodeo 50 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek RODEO 50 EW stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, jabłoń, grusza, winorośl, rośliny ozdobne uprawiane w szklarni
Substancja aktywna	cyflufenamid 50g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw; mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy winorośli; dodatkowo w uprawie pszenżyta ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści, w uprawie jęczmienia jarego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy zbóż, w uprawie jęczmienia ozimego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia, rynchosporiozy zbóż.
Dawka	0,1-0,5l/ha

Rubikon 67,8 WG*

Produkt referencyjny
Ridomil Gold
Pepite 67,8 WG



Rubikon 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami: ogórka i roślin ozdobnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych i ręcznych.

Roślina chroniona	ziemniak, pomidor, cebula, inne warzywa i rośliny ozdobne
Substancja aktywna	metalaksyl – M 3,8%, mankozeb 64%
Zwalczane choroby	alternarioza, zaraza ziemniaka, mączniak rzekomy, bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych, fytoftoroza (liści i łodyg)
Dawka	2-2,5kg/ha

* produkt zawiera mankozeb, sprzedaż możliwa do 31 października 2021.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Sendo 60 EC Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, rzepak ozimy
Substancja aktywna	metkonazol 60 g/l
Zwalczane choroby	septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
Dawka	0,7l-1,5l/ha

Spector 33 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	groch pastewny, groch siewny, łubin wąskolistny, biały i żółty, malina, czarna porzeczka, truskawka, wiśnia, inne warzywa i owoce
Substancja aktywna	piraklostrobina 67g/kg, boskalid 267g/kg
Zwalczane choroby	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium, czerń krzyżowych, szara pleśń, alternarioza naci, mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka, alternarioza, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora, rizoktonioza
Dawka	0,5-1,8kg/ha

Sendo 60 EC

Produkt referencyjny
Sirena 60 EC



Spector 33 WG

Produkt referencyjny
Signum 33 WG



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Silvestro 250 EC

Produkt referencyjny
Protendo Extra



Tarot 200 EC Tarot Pro 200 EC

Produkt referencyjny
Talius 200 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Silvestro 250 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, żyto
Substancja aktywna	protiokonazol 125g/l , tebukonazol 125g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż,, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa liści
Dawka	0,75–1,0l/ha

Tarot 200 EC i Tarot Pro 200 EC to środki grzybobójcze w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary
Substancja aktywna	proquinazid 200 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia
Dawka	0,15–0,25l/ha
Mieszaniny	W wybranych uprawach można stosować łącznie z preparatem Zamir 40 EW

Tarot Sad 200 EC Fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego. Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza
Substancja aktywna	proquinazid 200g/l
Zwalczane choroby	mączniak jabłoni, mączniak jabłoni (na gruszy)
Dawka	0,2-0,3/ha

Tauron 240 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	rzepak ozimy i jary
Substancja aktywna	protiokonazol 80 g/l, tebukonazol 160 g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń
Dawka	0,75-1l/ha

Tarot Sad 200 EC

Produkt referencyjny
Talius Sad



Tauron 240 EC

Produkt referencyjny
Tilmor 240 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Trident 375 SC

Produkt referencyjny
Toprex 375 SC



Vivero 500 SC / Vivero Duo 500 SC

Produkt referencyjny
Vivando



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Trident 375 SC Fungicyd i regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin i ich wyleganiu oraz w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI – DMI (wg FRAC Grupa 3).

Roślina chroniona	rzepak ozimy (regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu)
Substancja aktywna	difenokonazol 250g/l, paklobutrazol 125g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)
Dawka	0,35/ha

Vivero 500 SC/Vivero Duo 500 SC Vivero 500 SC i Vivero Duo 500 SC to fungicydy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, plecakowych i półkowych. Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach/pieczarkarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Roślina chroniona	pieczarka – w uprawie pod osłonami typu pieczarkarnia, pomidor, bakłażan, papryka, ogórek, cukinia, melon – w uprawie pod osłonami typu szklarnia
Substancja aktywna	metrafenon 500g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy pomidora, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy dyniowatych, daktylium
Dawka	0,04–0,3l/ha; pieczarka – 1ml/m ² podłoża



Nowość Rudnikagro!

**Prochloraz zarejestrowany
w zbożach ozimych, rzepaku ozimym i jarym.
Wybierz najwyższą jakość i najlepszą cenę!**

Agat 480 SC

Produkt referencyjny
Goal 480 SC



Agat 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu kontaktowym. Po aplikacji na powierzchnię gleby tworzy warstwę nad jej powierzchnią, dzięki czemu kielkujące chwasty zamierają stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie. Substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do inhibitorów oksydazy protoporfirynogenowej (PPO). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło uaktywnia biologiczne działanie oksyfluorofenu. Objawy działania środka pojawiają się krótko po wykonaniu oprysku. W miejscu kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek, następnie pojawiają się chlorotyczne plamy przypominające swoim wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do szybkiej śmierci roślin. Całkowity efekt działania środka (zasychanie roślin) występuje po około 7 dniach od wykonania zabiegu. Środek stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści.

Roślina chroniona	cebula uprawiana z siewu
Substancja aktywna	oksyfluorofen 480g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny. chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, żóttlica drobnokwiatowa chwasty odporne: samosiewy rzepaku.
Dawka	0,05l/ha

Aria 100 EC

Produkt referencyjny
Agil-S 100 EC



Aria 100 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Aria 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka i uprawy małoobsz.
Substancja aktywna	propachizafop 100g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusz-nik krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Dawka	0,5-1,5l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Artegon 450 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej(WG), stosowany nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna aminopyralid do grupy O.

Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym, uzupełniającym się sposobie działania. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, zaś substancja czynna aminopyralid powoduje blokadę auksyn, tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Ponadto, zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza. W warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5 °C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	florasulam 150g/kg, aminopyralid 300 g/kg
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: fiołek polny powyżej fazy 5 liści (BBCH 15), jasnota purpurowa, ostróżeczka wschodnia chwasty wrażliwe: ambrozja bylicolistna, fiołek polny do fazy 5 liścia (BBCH 15), komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, samosiewy słonecznika, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny
Dawka	25-33g/ha

Benta Duo 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednoročných chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym.

Roślina chroniona	ziemniak, fasola, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Substancja aktywna	bentazon 480g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotowy. Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.
Dawka	2,5-3l/ha

Artegon 450 WG

Produkt referencyjny
Dragon 450 WG



Benta Duo 480 SL

Produkt referencyjny
Basagran 480 SL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Bingo 600 SC

Produkt referencyjny
Bandur 600 SC



Difenikan 500 SC

Produkt referencyjny
Diflanil 500 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Bingo 600 SC Herbicyd selektywny, o działaniu kontaktowym, występującym w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3. Herbicyd stosowany dogłębowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liścienie oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kiełkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liścieni. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2–3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne. Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka. Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykiełkowaniu rośliny uprawnej.

Roślina chroniona	ziemniak, uprawy małoobsz. takie jak groch zwyczajny (uprawiany na suche nasiona), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, czosnek i inne
Substancja aktywna	aklonifen 600 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała Chwasty średnio wrażliwe: rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty). Chwasty odporne: iglica pospolita
Dawka	2,5–3l/ha

Difenikan 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sadach jabłoniowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona	pszenica ozima, sady jabłoniowe
Substancja aktywna	diflufenikan 500 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: pszenica: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity; sady: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: pszenica: przetacznik perski, przytulia czepna; sady: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepna.
Dawka	pszenica 0,3l/ha; sady 0,6l/ha

Etos 500 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym dogłębowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednolściennych w uprawie buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Etos 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednolściennych pobierają środek głównie poprzez część podliścienną i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kielkowania i krótko po wschodach (faza liści). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)
Substancja aktywna	etofumesat 500g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne; samosiewy rzepaku (kielkujące z nasion w stadium liści), szarłat szorstki chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, rdest ptasi, chwasty odporne: perz właściwy
Dawka	0,2l/ha x 3 zabiegi; możliwa mieszanina z innymi herbicydami
Mieszaniny	Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha (dawki dzielone) Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC (dawki dzielone) 1l/ha

Flash 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednolściennych w pszenicy ozimej, pszenicy ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Środek Flash 069 EW stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	fenoksaprop-P 69g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polny chwasty odporne: przytulia czepna
Dawka	1-1,2l/ha, z adiuwantem 0,5l/ha

Etos 500 SC

Produkt referencyjny
Kemiron Koncentrat 500 SC



Flash 069 EW

Produkt referencyjny
Foxtrot 069 EW



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Foster Forte 150 EC

Produkt referencyjny
Fusilade Forte 150 EC



Foster Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluazyfop-P-butyłowy została zaklasyfikowana do grupy A. Foster Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozgów chwastów.

Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Foster Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

Roślina chroniona

burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, uprawy małoobsz (burak pastewny, rzepak jary, cebula, marchew, papryka i inne warzywa, wiśnia, porzeczka i inne owoce, inne rośliny)

Substancja aktywna

fluazyfop-P-butyłowy 150 g/l

Zwalczane chwasty

Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż – dawka 0,63 – 0,83 l/ha; miotła zbożowa, wyczyniec polny – dawka 0,83 l/ha; perz właściwy – dawka 1,7 l/h

Komandos 560 SC

Produkt referencyjny
Komplet 560 SC



Komandos 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym dogłębowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kiełkujących chwastów, a zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona

pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.

Substancja aktywna

diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l

Zwalczane chwasty

chwasty wrażliwe np: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata.
chwasty średnio wrażliwe np: bodziszek drobny, przetacznik bluszczowy.

Dawka

0,4-0,5 l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Laserto 050 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B.

Laserto 050 SC jest herbicydem zaliczanym do inhibitorów działania enzymu – syntetazy acetylmleczanowej (ALS), biorącego udziału w biosyntezie aminokwasów, co w konsekwencji powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Produkt pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany do innych części rośliny. Efekt działania pojawia się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych stożkach wzrostu rośliny, jako nekrozy i chlorozy. Górne liście są zwiędnięte i stopniowo efekt ten dotyka liście z niższych partii rośliny. Widoczne są także chlorozy lub czerwienienie liści. Następuje też spowolnienie lub zahamowanie wzrostu. Całkowita zaschnięcie liści następuje po 7-10 dniach w korzystnych warunkach lub do 6-8 tygodni w niekorzystnych.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies
Substancja aktywna	florasulam 50g/l
Zwalczane chwasty	Zboża ozime – dawka 0,1 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty (syn. rdestówka powojowata). Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi. Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny Zboża jare – dawka 0,1 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żótlca drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rdest plamisty, poziewnik szorstki. Chwasty średnio odporne: komosa biała, fiołek polny, jasnota purpurowa. Chwasty odporne: bodziszek drobny Zboża jare – 0,08 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowaty (rdestówka powojowata), żótlca drobnokwiatowa, przetacznik perski Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, chaber bławatek Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, bodziszek drobny
Dawka	0,08-0,1 l/ha

Laserto 050 SC

Produkt referencyjny
Saracen 050 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Laserto D 550 SC

Produkt referencyjny
Saracen Delta 550 SC



Laserto D 550 SC Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy FI.

Herbicyd zawierający dwie biologicznie czynne substancje o odmiennych mechanizmach działania. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomleczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach. Symptomy pojawiają się najpierw na górnych częściach merystemów wzrostu rośliny jako chlorozy i nekrozy. Nowe, górne liście ulegają zwiędnięciu, a po nich stopniowo liście z niższych partii rośliny. Na niektórych gatunkach chwastów dochodzi do zaczerwienienia żyłek liści. Całkowite zasychanie liści następuje w optymalnych warunkach atmosferycznych po 7–10 dniach, natomiast w warunkach niekorzystnych dopiero po 6–8 tygodniach. Substancja czynna diflufenikan należy do grupy fenoksynikotynoanilidów, które działają jak inhibitor biosyntezy karotenoidów w komórkach chwastów. Karotenoidy są barwnikami wymaganymi do procesu fotosyntezy u roślin. Brak tych struktur powoduje zbielenie tkanek liści rozpad komórek, co szczególnie jest widoczne w przypadku nowych tkanek. Diflufenikan najlepiej działa na młode, aktywnie rosnące chwasty. Diflufenikan zapewnia ochronę do 8 tygodni po zastosowaniu.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime
Substancja aktywna	diflufenikan 500g/l, florasulam 50g/l
Zwalczane chwasty	Stosowanie środka na jesieni (dawka środka: 75 ml/ha) Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowaty, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku Stosowanie środka na wiosnę (dawka środka: 100 ml/ha) Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łośnica pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziomnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy) rumianek polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, powój polny, łoboda rozłożysta. Chwasty średnioporne komosa biała.
Dawka	75–100ml/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Nokaut 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7–10 dni, a po okresie 2–4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, owies, kukurydza
Substancja aktywna	tritosulfuron 250g/kg (25%); dikamba 500g/kg (50%)
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. chwasty średnio wrażliwe, np.: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny. chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi. chwasty odporne, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.
Dawka	0,2kg/ha
Mieszaininy	Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha+ Olbras 88 EC 1l/ha

Paxio 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy). Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10–19), tj.: od pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu lub więcej liści, na chwasty aktywnie rosnące i niezakryte przez roślinę uprawną. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	pinoksaden 50g/l
Zwalczane chwasty	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime – miotła zbożowa, wyczyniec polny, żyto – miotła zbożowa, pszenica jara, jęczmień jary – owies głuchy, chwastnica jednostronna
Dawka	0,6–0,9l/ha

Nokaut 75 WG

Produkt referencyjny
Mocarz 75 WG



Paxio 50 EC

Produkt referencyjny
Axial 50 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Prince 400 SC Prince Duo 400 SC

Produkt referencyjny
Turbopropyz 400 SC



Pro-Metobro 500 SC

Produkt referencyjny
Proman 500 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Prince 400 SC i Prince Duo 400 SC to środki chwastobójcze w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowane nalistnie, przeznaczone do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Prince 400 SC pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Środek działa na chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.

Roślina chroniona	rzepak ozimy
Substancja aktywna	propyzamid 400g/l
Zwalczane chwasty	miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczowy, przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest powojowaty
Dawka	1,25-2,1 l/ha

Pro-Metobro 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku. Jest produktem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak, uprawy małoobsz. (soja, słonecznik, bobik)
Substancja aktywna	metobromuron 500g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziwnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żóltlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty, szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha). Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się
Dawka	2-4 l/ha

Tarracco® 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany doglebowo i nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II.

Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny.

Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny
Substancja aktywna	metamitron 700g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przytulia czepna
Dawka	3x1,5l/ha

* Znak zastrzeżony Rudnikagro sp. z o.o.

Twist 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty proso-wate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy połowych.

Roślina chroniona	kukurydza, ziemniak, pomidor
Substancja aktywna	rimsulfuron 250g/kg
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlec obrotowy. chwasty średnioodporne: przetacznik perski.
Dawka	20-60g/ha

Tarracco® 700 SC

Rejestracja własna
Rudnikagro



Twist 25 WG

Produkt referencyjny
Titus 25 WG



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Zorba 340 SE* Zorba Duo 340 SE*

Produkt referencyjny
Zeagran 340 SE



Zorba 340 SE i Zorba 340 SE to środki chwastobójcze w formie zawiesino-emulsji, stosowane powschodowo, przeznaczone do zwalczania jednolrotnych chwastów dwuliściennych w kukurydzy.

Preparat zawiera dwie substancje aktywne o uzupełniającym się mechanizmie działania. Bromoksynil działa kontakto-wo, pobierany jest głównie przez liście, terbutylazyna pobierana jest przez liście i korzenie roślin wrażliwych, wykazuje długotrwałe działanie w glebie. Środek powoduje zasychanie, a następnie zamieranie roślin. Najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści.

Roślina chroniona	kukurydza
Substancja aktywna	bromoksynil – 90 g/l, terbutylazyna – 250 g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, maruna bezwonna, przytulia czepna, psianka czarna, rdest plamisty, rdest powojowy, rdest ptasi, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna (w dawce 2,0 l/ha) chwasty odporne: ostrożeń polny, skrzyp polny, chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Dawka	1,6–2 l/ha

* produkt zawiera bromoksynil, sprzedaż możliwa do 31 lipca 2021.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rejestracja własna Rudnikagro

**Herbicyd przeznaczony do ochrony
burak cukrowego, pastewnego
i ćwikłowego.**

Tarracco® 700 SC zwalcza m.in.:

- fiołka polnego
- gorczycę polną
- gwiazdnicę pospolitą
- komosę białą
- przytulię czepną
- rdest plamisty
- tasznika pospolitego
- tobołki polne

Corleone 200 SC

Produkt referencyjny
Coragen 200 SC



Corleone 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Roślina chroniona	jabłoń, ziemniak, kapusta głowiasta biała, kukurydza, uprawy małoobsz. (grusza, śliwa, winorośl, kalafior i inne)
Substancja aktywna	chlorantraniliprol 200g/l
Zwalczane szkodniki	owocówka jabłkóweczka, zwójkówek liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), tantniś krzyżowiaczek, omacnica prosowianka, owocówka śliwkóweczka, zwójka cyklamienowa (kapuściana), piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
Dawka	50ml-210ml/ha

Coxima

Produkt referencyjny
Velum Prime



Coxima Nematocyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu kontaktowym i układowym. Środek do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak, uprawy małoobsz. (marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy)
Substancja aktywna	fluopyram 400g/l
Zwalczane szkodniki	mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny, guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicianie glebowe rodzaju <i>Trichodorus</i> spp. i <i>Tylenchorhynchus</i> spp.
Dawka	0,625l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

SKUP ZBÓŻ

NAWOZY

Delta 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy i jary, jabłoń, śliwa, pomidor, kapusta i inne rośliny warzywne
Substancja aktywna	deltametryna 50 g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca burakowa, pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyce, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, gnataz rzepakowic, chowacz brukwiaczek, pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, słodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko słodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębego), szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik), mszyca kapuściana, kwiecień jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, kwiecień malinowiec, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, mszyca różana – szczeciowa, skoczek różany
Dawka	0,1-0,25l/ha

Emporia 018 EC jest środkiem owadobójczym i przedziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, obojętnej, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Roślina chroniona	grusza, truskawka, malina, jeżyna, obojętnej, ogórek, papryka, pomidor, chryzantema, róża.
Substancja aktywna	abamektyna 18g/l
Zwalczane szkodniki	miodówka gruszowa plamista, przedziorek chmielowiec, wciornastek zachodni, miniarki
Dawka	0,5-1,2l/ha

Delta 50 EW

Produkt referencyjny
Decis Mega 050 EW



Emporia 018 EC

Produkt referencyjny
Acaramic 018 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Filary 100 OD

Produkt referencyjny
Benevia 100 OD



Insektus Duo 500 EC

Produkt referencyjny
Cyperkill Max 500 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Filary 100 OD Insektycyd w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żółdkowym. Na roślinie działa wgłębnie oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3-6 dniach od zabiegu. Substancja czynna cyjantraniliprol należy do grupy IRAC 28.

Roślina chroniona	ziemniak, marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek, kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, truskawka
Substancja aktywna	cyjanotraniliprol 100g/l
Zwalczane szkodniki	stonka ziemniaczana, wciornastki, potyśnica marchwianka, piętnówka kapustnica, tanńś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, kwieciek malinowiec, śmietka cebulanka, miniarka porówka, światłówka naziemnica, bawełnowka egipska, błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny, muszka plamoskrzydła
Dawka	125-750ml/ha

Insektus Duo 500 EC Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żółdkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień jary, ziemniak, rzepak ozimy, kapusta głowiasta, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, uprawy małoobsz (burak cukrowy, burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, len, konopie, bobik, burak pastewny, sałata, brokuł, bób, fasola, kalafior, inne warzywa i rośliny ozdobne)
Substancja aktywna	cypermetryna 500g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca zbożowa, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, gąsienice tanńsia krzyżowiaczka, mszyca grochowa, wciornastki, szarek komośnik, tarczyk mgławcy, tarczyk złotosmugi, drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, zmieniki, gąsienice zjadające liście, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, pchełki, piętnówka, kapustnica, tanńś krzyżowiaczek, wciornastki, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
Dawka	0,05-0,06l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

SKUP ZBOŻ

NAWOZY

Miros 20 SP i Marabel 20 SP to środki owadobójcze w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczone do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, w lasach, w leśnych szkółkach iglastych i liściastych drzew i krzewów, w uprawach leśnych, na plantacjach nasiennych świerka i modrzewia. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Mogą być stosowane przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.

Roślina chroniona	ziemniak, rzepak ozimy, rośliny sadownicze, warzywno i ozdobne, lasy i uprawy leśne, plantacje nasienne świerka i modrzewia
Substancja aktywna	acetamipryd 20%
Zwalczane szkodniki	larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, przyszcerek kapustnik, chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny, gnataz rzepakowiec, mszyce, toczyk gruszwiaček, owocówka jabłkóweczka, owocnica jabłkowa, przyszcerek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka, nasionnica trześniówka, owocnice śliwowe, owocówka śliwkóweczka, opuchlaki, brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójki jodłowe, barczatka sosnowka, osnuja gwiaździsta, boreczniki sosnowe, śmietka modrzewiowa, osnuja gwiaździsta, ochojniki, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miodówka gruszowa plamista, miodówka gruszowa czerwona, miodówka gruszowa żółta, słuzownica ciemna, kwiecień gruszwiec, przyszcerek gruszwiec, misecznik śliwowy, licinek tarninacek, kwiecień pestkowiec, ogrodnica niszczylistka, przyszcerek borówkowiec, krzywik maliniacek, kwiecień malinowiec, kistnik malinowiec, przyszcerek namaleńki łąkowy, przeziernik malinowiec, krzywik porzeczkowiec, przyszcerek porzeczkowiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec, zmieniki, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, Śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka glebowa, strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, pchełka burakowa, drobica burakowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiora, pchełki, skoczgonki, mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni, miniarki, krobik modrzewiowiec
Dawka	0,08–0,4kg/ha

Modivo 60 CS Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary
Substancja aktywna	gamma-cyhalotryna 60g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca zbożowa, skrzypionki, chowacz brukwiacek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Dawka	50–80ml/ha

Marabel 20 SP Miros 20 SP

Produkt referencyjny
Mospilan 20 SP



Modivo 60 CS

Produkt referencyjny
Nexide 60 CS



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rovar Bis 500 EC Rovar Duo 500 EC

Produkt referencyjny
Actellic 500 EC



Rovar 20 FU świeca dymna

Produkt referencyjny
Actellic 20 FU



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rovar Bis 500 EC i Rovar Duo 500 EC to środki owadobójcze w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, przeznaczone do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji

Zastosowanie	dezynsekcja magazynów i nasion przeznaczonych do konsumpcji
Substancja aktywna	pirymifos metylowy 500 g/l
Zwalczane szkodniki	wołek zbożowy, spichrzel surynameński, trojszyk ulec
Dawka	1l/1000m ³ ; 0,8ml/1t nasion

Rovar 20 FU Insektycyd o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Roślina chroniona	dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych
Substancja aktywna	pirymifos metylowy 225g/kg
Zwalczane szkodniki	szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów: wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynameński, kapturek zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny.
Dawka	1 świeca na 400-500 m ³ pomieszczenia

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

SKUP ZBÓŻ

NAWOZY

Sagitta Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji. W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna flupyradifuron zaliczana jest do grupy butenolidów – 4D.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza, chmiel, rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia), uprawy małoobsz. truskawka; bakłażan, pomidor, papryka, ogórek (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
Substancja aktywna	flupyradifuron 200 g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyce, mączlik szklarniowy, miodówka jabłoniowa, Owocnica jabłkowa, miodówka gruszowa plamista, mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu – HpMV), mszyca gruszowo-podbiałowa, mszyca gruszowo – przytuliowa, mszyca ogórkowa, mączliki
Dawka	0,4–0,9l/ha

Tekapo 025 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych i warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek stosuje się używając opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak, peluszką, bobik, len, rośliny warzywne
Substancja aktywna	beta-cyflutryna 25g/l
Zwalczane szkodniki	przędziorek owocowiec, przędziorek chmielowiec, pordzewiacz jabłoniowy, podskórnik gruszowy, wzdymacz gruszowy, pordzewiacz śliwowy, wielkopąkowiec porzeczkowy, roztocz truskawkowiec
Dawka	0,2–0,4l/ha

* produkt zawiera beta-cyflutrynę, sprzedaż możliwa do 30 maja 2021.

Sagitta

Produkt referencyjny
Sivanto Prime



Tekapo 025 EC*

Produkt referencyjny
Bulldock 025 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Certes 480 SL

Produkt referencyjny
Cerone 480 SL



Certes 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Certes 480 SL stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zwartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zastosowanie	jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	etefon 480 g/l
Dawka	0,75–1,5l/ha

Midas 250 EC Midas Duo 250 EC

Produkt referencyjny
Moddus 250 EC



Midas 250 EC i Midas Duo 250 EC to środki z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Produkty te stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środki do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środki pobierany są głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powodują redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środków. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środków silniejszym skróceniem międzywęźli.

Zastosowanie	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i owies
Substancja aktywna	trineksapak etylu 250g/l
Dawka	0,3l–0,6l/ha

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Scarlet 85 SG jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu i rozwoju roślin występującym w postaci granulatu rozpuszczalnego w wodzie. Środek Scarlet 85 SG stosuje się w uprawie złocieni doniczkowych i poinsecji w celu skrócenia międzywęźli, umożliwiając uzyskanie korzystnego pokroju roślin, oraz zwiększenie równomierności wzrostu i kwitnienia. Środek Scarlet 85 SG stosuje się używając opryskiwaczy ręcznych.

Zastosowanie	złocien doniczkowy, poinsecja
Substancja aktywna	daminozyd 850 g/kg
Dawka	0,25–0,5 kg/ha

Stopper Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.

Zastosowanie	ziemniak (zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania)
Substancja aktywna	1,4-dimetylonaftalen 980g/kg
Dawka	20 ml/1000 kg bulw

Scarlet 85 SG

Produkt referencyjny
B-nine 85 SG



Stopper

Produkt referencyjny
1,4Sight



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Goliat 025 FS

Produkt referencyjny
Maxim 025 FS



Goliat 025 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu powierzchniowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej, pszenicy jarej, pszenżyta ozimego oraz żyta ozimego przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza powodowanymi przez grzyby rodzaju Fusarium.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto ozime
Substancja aktywna	fludioksonil 25g/l
Zwalczane choroby	pleśń śniegowa zbóż i traw, śnieć cuchnąca pszenicy, zgorzel siewek (fuzarioza siewek, septorioza siewek), głośnia żdźbłowa żyta
Dawka	200ml/100kg ziarna

Goliat Trio 060 FS

Produkt referencyjny
Celest Trio 060 FS



Goliat Trio 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	fludioksonil 25 g/l, difenokonazol 25g/l, tebukonazol 10g/l
Zwalczane choroby	zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głośnia pyłająca pszenicy, pasiastosc liści jęczmienia, głośnia pyłająca jęczmienia, głośnia żdźbłowa żyta
Dawka	200ml/100kg ziarna

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

SKUP ZBÓŻ

NAWOZY

Retro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies
Substancja aktywna	protriakonazol 150 g/l, tebukonazol 20 g/l
Zwalczane choroby	pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłaca jęczmienia, głownia pyłaca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia żdźbłowa żyta
Dawka	50–66,7ml/100 kg ziarna

Savea 333 FS to fungicyd w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób odnasiennych oraz chorób liści.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Substancja aktywna	fluksapyroksad 333g/l
Zwalczane choroby	septorioza liści, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia
Dawka	150ml/100kg ziarna
Mieszanina	jęczmień jary: Savea 333 FS 75 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml / 100 kg ziarna siewnego pozostałe zboża: Savea 333 FS 150 ml + Kinto Duo 080 FS 200 ml/100 kg ziarna siewnego.

Retro 170 FS

Produkt referencyjny
Redigo Pro 170 FS



Savea 333 FS

Produkt referencyjny
Systiva 333 FS



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rekomendowane jęczmiona jare:



AVATAR

ODMIANA WZORCOWA

od 2019 roku
wzorzec COBORU

NOWOŚĆ

- Bardzo wysoki i stabilny plon, w Polsce nawet do 112% wzorca, w badaniach niemieckich nawet do 114% wzorca.
- Wczesny termin kłoszenia zapewnia odporność na zmieniające się warunki glebowo-klimatyczne (okresowe susze).
- Wczesny termin kłoszenia zapewnia odporność na zmieniające się warunki glebowo-klimatyczne (okresowe susze).
- Znakomita jakość dzięki **dobremu wyrównaniu** i dorodności ziarna. **Idealny komponent do mieszanek zbożowych.**

Laureate

Jęczmień jary

Czołowa odmiana w europejskim słodownictwie

NOWOŚĆ

- Nowa odmiana jęczmienia browarnego charakteryzująca się wysokim i stabilnym poziomem plenności w wielu państwach europejskich.
- Laureate charakteryzuje wysoka odporność na choroby - szczególnie na **mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia oraz plamistość siatkową.**

Na paszę, browar i whisky!

Jęczmień jary Laureate oprócz ponadprzeciętnej jakości browarnej posiada także bardzo wysoki potencjał plonowania w produkcji na paszę. **Jest to jedna z czołowych odmian pod względem plonowania w Niemczech** spośród wszystkich jęczmieni jarych, a do tego charakteryzuje się stabilnym plonowaniem.



Co zapewnia wysoką jakość nasion Wronkowski?

- ✓ Nowoczesna linia technologiczna.
- ✓ Nowoczesna fotokomórka **FULLCOLOR**
czyszczenie nasion z użyciem technologii elektro-optycznej dzięki wykorzystaniu sterowników wyposażonych w nową generację kamer 4K.
- ✓ Osobisty nadzór podczas czyszczenia i zaprawiania nasion.
- ✓ Wielokrotna kontrola i profesjonalne prowadzenie plantacji nasiennych.
- ✓ Nowoczesna linia zaprawiająco-pakująca z zaprawiarką porcjową o wydajności do 30 t/h.
- ✓ 100% udziału stołu grawitacyjnego w procesie przygotowywania materiału siewnego.
- ✓ Jakość potwierdzona certyfikatami: **ESTA oraz SYNGENTA.**
- ✓ Firma Przyjazna dla Rolnika
laureat plebiscytu izydory 2020 kat. nasiennictwo



W naszej ofercie znajdziesz ponadto / rekomendowane zboża ozime:

Asory
PSZENICA OZIMA

PRODUZENT
PSZENICA OZIMA

LG Mocca
PSZENICA OZIMA

SU Libor us
pszenżyto ozime
Nr 2 COBORU

Corado
Pszenżyto ozime
Nr 1 COBORU

DAŃKOWSKIE Skand

OBRÓT PŁODAMI ROLNYMI

Rudnikagro Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą branży rolnej. Prowadzimy skup zbóż i rzepaku w naszym magazynie, jak również odbieramy towar bezpośrednio od Klienta. Dbamy przy tym, aby transakcje zawierane z naszymi odbiorcami były zawsze ubezpieczone i pewne, co daje gwarancję terminowej zapłaty za dostarczony przez Kontrahenta towar. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem zapewniając naszym klientom nie tylko konkurencyjne ceny, ale też szybki odbiór i sprawną realizację zawartych umów.

Dysponujemy profesjonalnym laboratorium, w którym można wykonać rzetelne badania jakości swojego towaru. Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi przewoźnikami i realizujemy nasze umowy zarówno drogą lądową, śródlądową, morską i kolejową, zależnie od potrzeb i możliwości.

Posiadamy wszystkie wymagane certyfikaty bezpieczeństwa w tym GMP+ B3 oraz RedCert



Prowadzimy skup:

- pszenicy konsumpcyjnej
- pszenicy paszowej
- jęczmienia browarnego
- jęczmienia paszowego
- pszenżyta
- żyta konsumpcyjnego
- żyta paszowego
- kukurydzy
- rzepaku
- owsa
- łubiu
- grochu
- innych surowców

Mocne strony współpracy z nami to:

- Gwarancja bezpieczeństwa transakcji
- Krótkie terminy płatności
- Szybka realizacja umów
- Terminowe płatności
- Profesjonalne doradztwo

Informacje na temat skupu, bieżących cen, notowań:

Sebastian Lebiecki
mob. +48 781 900 045
email: s.lebiecki@rudnikagro.pl



NASIONA ZBÓŻ, KUKURYDZY, RZEPAKU I INNYCH ROŚLIN ROLNICZYCH

Rudnikagro oferuje kwalifikowany materiał siewny zbóż, rzepaku i kukurydzy większości liderów branży nasiennej. Dostarczamy najbardziej popularne odmiany w konkurencyjnych cenach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy również nasiona mieszanek traw i nasion rolniczych, takich jak łubin, bobik, groch i inne.





Firma Rudnikagro Sp. z o.o. dostarcza szeroki asortyment nawozów mineralnych, krajowych i zagranicznych producentów. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem niemieckiego producenta wapna nawozowego Wesling.

Gwarantujemy najwyższą jakość oferowanych produktów oraz profesjonalną obsługę, a zarazem konkurencyjne ceny i warunki handlowe.

Oferujemy Państwu również nawozy do dożywiania dolistnego makro i mikroelementowe, oraz biostymulatory oparte na naturalnych składnikach.

Doradzamy naszym Klientom w doborze nawozów uwzględniając specyfikę uprawy i rodzaj podłoża w celu optymalnego wykorzystania składników pokarmowych i zwiększenia jakości oraz wysokości plonów.



**GRUPA
AZOTY**

**Anwil®**
GRUPA **ORLEN**

**K+S**

**SIARKOPOL**

**WESLING**
Kruszywa

Kontakt z działem nawozów:

Piotr Griszke

tel. 607 810 800

e-mail: p.griszke@rudnikagro.pl

TRACEGROW

grow with us



NAWOZY DOLISTNE PREMIUM

ZM-Grow™ i ZMC-Grow prawdziwie ekologiczne nawozy wytwarzane z metali po recyklingu

Nawozy dolistne Tracegrow Premium

ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ to kompleksowe i innowacyjne nawozy dolistne, mające zastosowanie w każdej uprawie. Uzupełniają nie - dobór mikroelementów, zwiększają wigor roślin, podnoszą jakość i wysokość plonów. Zawarte w nich cynk, mangan i miedź wpływają na bardziej efektywne wykorzystanie nawozów NPK i zapewniają zrównoważone odżywianie.

Korzyści i funkcje

- Mangan wzmacnia odporność roślin na przymrozki.
- Miedź, zawarta w ZMC-Grow, podnosi plony, szczególnie owsa i jęczmienia
- Skuteczność w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym
- Produkty zrównoważone, produkowane z surowców o zerowej emisji CO2
- Doskonale przyswajalny, może być łączony ze środkami ochrony roślin i innymi preparatami AGRO
- 100% formy siarczanowej, najdogodniejszej dla roślin
- Bezproblemowa aplikacja, ponieważ produkty ZM-Grow™ oraz ZMC-Grow™ nie blokują dysz rozpylających



ZM-GROW™

Całkowita średnia zawartość składników pokarmowych:

Cynk 60 g / l (4,4%)
Mangan 67 g / l (4,9%)
Siarka 75 g / l (5,5%)
pH 3,9

Gęstość 1,36 kg / l

Dawka: 2-3 l / ha na 200-400 l wody

Produkty nawozowe ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ są dopuszczone do upraw ekologicznych w UE i są zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 2018/848.

Technologia Tracegrow jest opatentowana, a produkcja jest zgodna z normami ISO 9001 i 14001. Technologia Tracegrow zdobyła wiele nagród, w tym nagrodę Circwaste Fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska.

ZMC-GROW™

Całkowita średnia zawartość składników pokarmowych:

Cynk 58 g / l (4,1%)
Mangan 62 g / l (4,4%)
Miedź 27 g / l (1,9%)
Siarka 90 g / l (6,1%)
pH 3,8

Gęstość 1,40 kg / l



Lebosol®-Bor można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napełnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Bor powinien zostać dodany jako ostatni.

Etanolamina boru

Zawartość składników: 11% boru rozpuszczalnego w wodzie, odpowiednio 150 g/l B

Gęstość: 1,36 kg/l

Wartość pH: 7,9 – 8,1

Uprawa	Dawkowanie
Zboża	1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha lub 3x0,75 l/ha Od 3 liści oraz od początku strzelanie w źdźbło do fazy kłoszenia
Rzepak	1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha jesienią od stadium czwartego liścia do kwitnienia
Kukurydza	1-2 x 1,2 l/ha w stadium 6 – 8 liścia
Ziemniak	1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 6 liścia do zwierania rzędów
Burak	1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 4-6 liścia do zamykania międzyrzędzi

Lebosol®-Kupfer350 SC można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napełnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Kupfer350 SC powinien zostać dodany jako ostatni. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć.

Tlenochlorek miedzi

Zawartość składników: 24,2 % Miedzi odpowiednio 350 g/l Cu

Gęstość: 1,36 kg/l

Wartość pH: 7,9 – 8,1

Uprawa	Dawkowanie
Zboża	0,25 – 0,75 l/ha od fazy 3 liści do fazy końca krzewienia
Kukurydza	2 – 3 l/ha jesienią od fazy 4 do 6 liści
Winogrona winne	Stosować kilkakrotnie 0,25 – 0,75 l/ha od fazy 3 liścia do fazy gdy większość jagód styka się ze sobą
Dla wszystkich roślin	Przy nawożeniu dolistnym 0,25 – 0,75 l/ha w 200 – 400 l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,05 – 0,2 %

Lebosol®-Bor

nawóz WE



Lebosol®-Kupfer350 SC

nawóz WE



Lebosol®-Mangan-Nitrat 235

nawóz WE



Lebosol®-Mangan-Nitrat 235 to nawóz manganowy w formie roztworu.

Azotan manganu:

15 % manganu rozpuszczalnego w wodzie (235 g/l Mn);
7,7 % azotu całkowitego jako azotu azotanowego (120 g/l N)
Zawartość składników: 15 % Mn (235 g/l), 7,7 % N (120 g/l)
Gęstość: 1,55 kg/l
Wartość pH: 0 – 1

Substancja czynna produktu i jej działanie:

Dostępność manganu jest niska na glebach o dużej zawartości próchnicy, na glebach piaszczystych i lekkich/luźnych, na glebach o wysokiej wartości pH, jak również podczas chłódów i wysokiej wilgotności. Niedobór manganu uwidacznia się przez żółknięcie liści, występowanie czarnych punktów na liściach oraz obecność jasnozielonego marmurka pomiędzy głównymi nerwami liści. Gorsza jest również jakość produktów, np. zła jakość skórki u ziemniaków.

Uprawa	Cel	Zalecenia
Zboża	Odporność na mróz, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 l/ha jesienią od stadium 3 liści.
	Poprawa plonu, odporność na złamanie, zaopatrzenie w pierwiastki śladowe	1 – 2 l/ha wiosną, od początku wegetacji do fazy liścia flagowego.
Rzepak	Odporność; na mróz, zwiększenie odporności, poprawa plonu, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha jesienią od fazy 4 liści do fazy 6 liści.
Buraki cukrowe	Odporność, poprawa plonu, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha pomiędzy fazą 6 liści a zwieraniem się rzędów.
Ziemniaki	Zmniejszenie podatności na zarażenie parchem	1 l/ha dodatkowo do zaprawiania.
	Jakość skórki owocu, odporność, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha od początku zwierania się rzędów.
Dla wszystkich roślin użytkowych	Zaopatrzenie w mangan	Przy nawożeniu dolistnym – 1-2 l / ha w minimum 200 l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,25 – 0,5 %. Kilkakrotne zastosowanie małych ilości produktu zwiększa efektywność.
Truskawki, Rośliny jagodowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	2 l/ha od początku kwitnienia aż do zbiorów.
Owoce ziarnkowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	Stosować kilkakrotnie 1 l/ha od końca fazy kwitnienia (u odmian podatnych na ordzawienia od fazy gdy owoc osiąga wielkość 40mm (faza orzecha włoskiego)).
	Zielona barwa zasadnicza skórki	Trzykrotnie 1 l/ha po czerwcowym opadaniu owoców
Owoce pestkowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	2-3 aplikacje w ilości 1 l/ha od fazy zawiązywania owoców aż do zbiorów.
Warzywa psiankowe, dyniowate i strączkowe, Warzywa kapustne, liściowe i cebulowe, Warzywa korzeniowe, rzepowate i wieloletnie	Jakość liści, wybarwienie liści, odporność, zaopatrzenie w mangan	1 – 2-krotnie 2 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca ilość masy liściowej

Lebosol®-Molibdan to nawóz molibdenowy w formie roztworu.

15,6% molibdenu rozpuszczonego w wodzie (210 g/l Mo)

Zawartość składników: 15,6% Mo (210 g/l)

Gęstość: 1,37 kg/l

Wartość pH: 7,6

Wielkość opakowania: 1l

Substancja czynna produktu i jej działanie:

Dostępność molibdenu jest niska w glebach lekkich i kwaśnych (torfowe gleby piaszczyste, gleby z torfowisk wysokich, gleby ogrodnicze i substraty) oraz podczas suszy.

Niedobór molibdenu uwidacznia się głównie na liściach młodszych, ale również przez chlorozy liści starszych. Na brzegach liści występują nerkozy, liście zwijają się, powierzchnia blaszki liściowej jest ograniczona, częściowo tylko z rosnącym nerwem środkowym (beczkowatość liści). Głównie obserwuje się ograniczony wzrost roślin, jaśniejszą barwę liści oraz objawy ich wędnięcia. Różne kalafiora są zniekształcone i skręcone.

Roślina uprawna	Cel	Zalecenia
Dla wszystkich roślin użytkowych	Zaopatrzenie w molibden	Przy nawożeniu dolistnym 0,25 l/ha wco najmniej 200l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,05 – 0,1%
Warzywa kapustne, liściowe i cebulowe	Zapobieganie zanikowi liści sercowych oraz beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	1–2-krotnie 0,25 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca ilość masy liściowej
Rzepak	Zapobieganie beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	1–2-krotnie 0,25 l/ha o początku strzelania w źdźbło
Buraki cukrowe	Zapobieganie zanikowi liści sercowych oraz beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	0,25 l/ha pomiędzy fazą 6 liści a zwieraniem się rzędów

Tecnophyt Ph+ to płynny nawóz przeznaczony do aplikacji dolistnej, zawierający azot i fosfor i działający jako surfaktant, regulator i wskaźnik pH, adiuwant i przeciwspieniacz.

Podnosi aktywność i efektywność środków ochrony roślin i innych nawozów.

Tecnophyt pH+ jest zalecany do wszystkich rodzajów upraw: rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

Zawartość składników pokarmowych:

Fosfor (P2O5) 15% W/W, azot całkowity 3% W/W, azot w postaci mocznika 3% W/W

Adiuwant/wspomagacz/surfaktant

Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy (roztworu roboczego) gwarantując bardziej jednolite rozprawdzenie roztworu dając efekt zwilżenia. Napięcie powierzchniowe kropli (wynik przyciągania między cząsteczkami wody) działa jako bariera dla idealnego rozprawdzenia roztworu na powierzchni liścia. Dodanie Tecnophyt pH+ redukuje napięcie powierzchniowe z 72 dyn/cm2 do 35–40 dyn/cm2 przez co zwiększa się przyswajalność roztworu i jego zdolność do przyklejania się do blaszki liścia.

Aktywator i przeciwspieniacz

Przyspiesza pracę pompy protonowej w roślinie, która transportując jony H+, zwiększa pobór cieczy do wnętrza rośliny jak również uaktywnia komórki roślin do wytworzenia większej energii i absorpcji cieczy całą swoją powierzchnią. Redukuje pianę w roztworach cieczy roboczych z nawozami i pestycydami.

Regulator i wskaźnik pH

Tecnophyt pH+ zmniejsza negatywny i dezaktywujący wpływ twardej wody (o wysokiej zawartości kationów wapnia, magnezu i żelaza) na działanie środków ochrony roślin.

Tecnophyt pH+ zawiera w swojej formule wskaźnik pH, który zmienia kolor roztworu na różne odcienie czerwieni i żółci w zależności od poziomu kwasowości i zasadowości, wskazując optymalny poziom pH wody w granicach 4,5–5,5 kolorem jasnoczerwonym.

Lebosol®-Molibdan



Tecnophyt pH+



Sticker 550 EC



Sticker – preparat sklejający i powlekający. Zapobiega osypywaniu się nasion rzepaku i roślin strączkowych. Nie dopuszcza do porastania nasion zbóż.

Preparat Sticker 550 EC ogranicza pękanie łuszczyń i osypywanie się nasion rzepaku oraz obniża ryzyko porastania nasion przed zbiorem. Preparat tworzy lateksową powłokę na łuszczykach, strąkach i kłosach, która przyspiesza oddawanie wody nie spowalniając procesu dojrzewania. Powłoka ta zapobiega ponownemu wchłonięciu wody, dzięki czemu łuszczyzny i strąki nie otwierają się i nie tracą nasion. W zbożach powłoka ta również zabezpiecza kłos przed zbytnią absorpcją wody i nie dopuszcza do porastania nasion.

Dawkowanie:

Rzepak i rośliny strączkowe – zapobieganie pękaniu łuszczyń i strąków 0,6l-1l/ha, zalecana ilość wody 200 l/ha, w przypadku zagęszczonych łanów zaleca się 300 l wody/ha. Zalecana dawka w przypadku łącznego stosowania z desykantem – 0,5-0,6 l/ha. Preparat należy stosować około 3 – 4 tygodnie przed zbiorem rzepaku, gdy łuszczyzny zaczynają żółknąć, ale jeszcze są elastyczne i pozwalają się zginać bez pęknięcia (BBCH 81-83) W grochu środek stosować, gdy nasiona osiągną gorzki smak. Zalecanie opryskiwanie: średniokropliste.

Zboża – redukcja porastania nasion

0,5 l-0,6 l/ha, zalecana ilość wody 100-150 l/ha. Należy stosować w okresie pełnej dojrzałości woskowej ziarna. Zalecanie opryskiwanie: średniokropliste. Wykonać dopiero przed następnym użyciem, żeby zachować antykorozyjne działanie Protect-płynu.

Nova PeKacid jest nawozem fosforowo-potasowym, poprawiającym przyswajanie składników pokarmowych i może być stosowany do oczyszczania instalacji w opryskiwaczu.

1. Dzięki działaniu zakwaszającemu (pH 1% roztworu wynosi 2,2) PeKacid korzystnie wpływa na dostępność składników pokarmowych – makro- i mikroelementów dostępnych w glebie oraz podnosi stopień ich wykorzystania przez rośliny.

2. Skutecznie ogranicza powstawanie wapiennych osadów w opryskiwaczu, co obniża koszty jego konserwacji i przedłuża czas użytkowania.

3. Dostarcza fosfor i potas.

Azot całkowity (N)	0%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	60%
Rozpuszczalne w wodzie	26,2%
Tlenek potasu (K_2O)	20%
Rozpuszczalne w wodzie	16,6%

Dawkowanie

Nawożenie dolistne od 1,0 do 2,0 kg/ha w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny.

Nova Mag-S siarczan magnezu siedmiowodny to krystaliczny nawóz bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do dokarmiania dolistnego oraz do fertygacji roślin, szybko i efektywnie dostarcza roślinom magnez i siarkę – składniki niezbędne do uzyskania wysokich plonów o dobrej jakości: zawiązków.

MgO tlenku magnezu rozpuszczalnego w wodzie	16%
SO_3 trójtlenku siarki rozpuszczalnego w wodzie	32,5%

Dawkowanie

Zaleca się stosowanie 5% stężenia siarczanu magnezu (5kg na 100 l wody):
Zboża od fazy drugiego kolanka do końca kwitnienia
Rzepak od 4 liścia (zabieg jesienny) do momentu kwitnienia

Nova PeKacid



Nova Mag-S





AQUAFERT Uniwersalny

Skład nawozu w % (m/m):

Azot (N) całkowity	20% w tym:	Bor (B)	0.01%
Azot (N) azotanowy	5,90%	Miedź (Cu)	0.011%
Azot (N) amonowy	4,00%	Żelazo (Fe)	0.04%
Azot (N) amidowy	10,40%	Mangan (Mn)	0.021%
		Molibden (Mo)	0.001%
		Cynk (Zn)	0.02%
Zawartość kwasu fosforowego (P_2O_5)	20%		
Rozpuszczalny fosfor (P)	8,7%		
Nierozpuszczalny fosfor	BRAK		
Rozpuszczalny potas (K_2O)	20%		
Rozpuszczalny potas (K)	16,6%		

Najczęściej używany ze wszystkich nawozów rozpuszczalnych w wodzie to nawóz wielofunkcyjny AQUAFERT Uniwersalny. Bardzo skuteczny w przypadku wszystkich rodzajów roślin ze względu na zbilansowaną formułę, może być używany jeżeli tylko nie jest wymagana dokładniejsza formuła. Indywidualnie lub w połączeniu z innymi formułami NPK odpowiada na zapotrzebowanie wielu upraw na substancje odżywcze.

Zaleca się:

- odżywanie wszystkich upraw rolniczych i ogrodniczych.
- gdy wymagana jest zbilansowana formuła,
- jako nawóz do roślin liściastych w odpowiedzi na zapotrzebowanie na substancje



AQUAFERT Fosforowy

Skład nawozu w % (m/m):

Azot (N) całkowity	15,10% w tym:	Bor (B)	0.01%
Azot (N) azotanowy	4,50%	Miedź (Cu)	0.011%
Azot (N) amonowy	8,50%	Żelazo (Fe)	0.04%
Azot (N) amidowy	2,10%	Mangan (Mn)	0.021%
		Molibden (Mo)	0.001%
		Cynk (Zn)	0.02%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	29,80%		
Rozpuszczalny fosfor (P)	13%		
Nierozpuszczalny fosfor	BRAK		
Rozpuszczalny potas (K_2O) rozp. w wodzie	15,30%		
Rozpuszczalny potas (K)	12,70%		

Nawóz AQUAFERT Fosforowy to produkt o zwiększonej zawartości fosforu, który wzmacnia system korzeniowy rośliny. Zastosowanie wczesną wiosną, pozwala na likwidację niedoboru fosforu, wynikłego z niskiej temperatury podłoża. Bardzo dobra rozpuszczalność oraz dodatek mikroelementów, umożliwia roślinie szybszy wzrost i odbudowę liści po zimie.

Zaleca się:

- w przypadku zapotrzebowania na wysoki poziom fosforu
- w początkowej fazie wzrostu roślin uprawnych
- w celu uzupełnienia niedoboru fosforu

AQUAFERT

Rodzaj uprawy	Termin stosowania	Ilość zabiegów	Produkt	Dawka 1 ha
Pszenica	Jesień – wczesne fazy wzrostu	1	15-30-15	2-3 kg
	Wiosna Ruszenie wegetacji, krzewienie	1	20-20-20	3 kg
	Wiosna – kłoszenie Wiosna – po kwitnieniu	2 14 dni pomiędzy zabiegami	20-20-20	3 kg
Jęczmień Pszenżyto Żyto	Jesień – wczesne fazy wzrostu	1	15-30-15	2-3 kg
	Wiosna	1	20-20-20	2-3 kg
Kukurydza	4-6 liść	1	15-30-15	3-4 kg
	8-10 liść	1	20-20-20	2-3 kg
Rzepak	Jesień Faza rozety 4-8 liści	1	15-30-15	2-3 kg
	Wiosna – ruszenie wegetacji	1	20-20-20	3 kg
	Wiosna – faza zielonego pąka	1	15-30-15	2-3 kg

**WESLING**

Kruszywa Sp. z o.o.

Wesling Kruszywa Sp. z o. o.
ul. Gwiazdzista 10/16, 53-413 Wrocław

WAPNA NAWOZOWE:

- **Wapno węglanowe Boerde I**
ok. 50% CaO
- **Wapno węglanowo-magnezowe Saale I**
ok. 40% CaO 7% MgO
- **Wapno węglanowo-magnezowe Saale II**
ok. 30% CaO 14% MgO

Korzyści wynikające ze stosowania wapna:

- odkwaszanie gleby oraz utrzymanie właściwego pH
- dotlenienie gleby
- lepsza wchłanialność wody oraz składników mineralnych
- zahamowanie przenikania kwasów chemicznych do produktów rolnych
- poprawa składu chemicznego gleby

Wszystko to przekłada się na zwiększenie ilości oraz jakości plonów.

Dawka CaO w t/ha zależnie od pH gleby

KATEGORIA AGRONOMICZNA GLEBY	pH GLEBY				
	<4,5	4,5-5,1	5,2-6,1	5,7-6,1	6,2-6,6
Bardzo lekkie	2,5	1	-	-	-
Lekkie	5	3	1	-	-
Średnie	6	4	2	1	-
Ciężkie	6	5	3	1,5	1

Parametry chemiczne

NAZWA WAPNIA	WARTOŚCI PODANE W %					
	CaCO ₃	CaO	MgO	H ₂ O	Analiza sitowa	
Boerde I	85	50	1,5	3	odsiew na sicie 2mm	przesiew przez sito 0,5mm
Saale I	70	40	7	3	6	54
Saale II	55	30	14	3	7	55



Wapno Boerde I posiada dodatkowo świadectwo kwalifikacji do stosowania w rolnictwie ekologicznym.



Rudnikagro Sp. z o. o.
Pomorska 53,
70-812 Szczecin

DYSTRYBUTOR



Basic Power

BIOSTYMULATOR DOLISTNY

Odżywka dolistna (do mieszania z innymi
opryskami dolistnymi)

Z ekstraktów roślinnych zawiera:

MIKROELEMENTY (Fe 1,2% Mn 0,6% Zn 0,7%)

AMINOKWASY 46,6% (w tym lewoskrętne 15%) i azot organiczny 7,6%

- Wzmacnia rośliny, działa szybko i anty-stresowo (przymrozek, susza, grad, itp...)
- Jest szybko wchłaniana przez liście (nośnik: aminokwasy)
- Wyraźnie zwiększa plon i poprawia jego parametry

	CEL	DAWKĄ	OKRES STOSOWANIA
Rośliny uprawne: kukurydza, pszenica, rzepak, buraki	Działa antystresowo, wzmacnia rośliny, zwiększa plon	1-2 l/ha	Oprysk zmieszany z pestycydami lub podczas zabiegów środkami ochrony roślin
Warzywa w uprawach polowych: ziemniaki, pomidory, liściaste, kapustowe	Działa antystresowo, wzmacnia rośliny	2-2,5 l/ha	Oprysk zmieszany z pestycydami lub podczas zabiegów środkami ochrony roślin
Warzywa w uprawach szklarniowych	Działa antystresowo, wzmacnia rośliny	200-250 ml/hl	Oprysk zmieszany z pestycydami lub podczas zabiegów środkami ochrony roślin
Drzewa i krzewy owocowe	Działa antystresowo, wzmacnia rośliny, zwiększa ilość i masę owoców	2-3 l/ha	Aplikacje od wiązania kwiatów do końca wzrostu owoców co 10-15 dni
Uprawy kwiatowe	Działa antystresowo, wzmacnia rośliny	150-250 ml/hl	Aplikacje co 10-15 dni
Do mieszania z herbicydami, pestycydami	Zwiększa wydajność oprysku. Wzmacnia roślinę w czasie oprysku herbicydami	1 l/ha	

UWAGA

Mieszanie BASIC POWER z produktami zawierającymi duże ilości miedzi jest możliwe tylko dla pomidorów, ziemniaków i karczochów. Uwaga! Stosujemy z pestycydami, herbicydami, fungicydami. Nie ma dodatkowych korzyści z aplikacji. Szczegółowe informacje na stronie www.basicpower.pl. Produkt zgodny z regulacjami UE 2003/2003 i D-Lgs 75/2010. Wskazując przed użyciem

Opakowania: 1, 5 i 25 litrów

Wszystkie informacje na stronie:
www.basicpower.pl

Produkt sprawdza się najlepiej, gdy jest mieszany ze środkami ochrony roślin, a przede wszystkim wraz z opryskiem herbicydami.



Quix Total

ODŻYWKĄ MIKROELEMENTOWĄ
Z SYSTEMEM LSA

(efektywny biostymulator dolistny)

**B (Bor 0,6%), Cu (Miedź 0,4%), Fe (Żelazo 4,0%),
Mn (Mangan 2,0%), Mo (Molibden 0,2%), Zn (Cynk 1,0%)**

Quix Total:

- chroni przed niedoborami mikroelementów
- dokładnie pokrywa powierzchnię liści
- eliminuje fito toksyczność
- wyjątkowo szybko wchłaniany przez rośliny
- odżywia i chroni
- zawiera LSA

LSA to naturalny składnik pochodzenia roślinnego (ligniny), który sprawia, że wchłanianie dolistne składników odżywczych jest dużo większe. Produkty QUIX zalecane są do mieszania z opryskami chemicznymi, zwiększając ich skuteczność i efektywność. QUIX podnosi metabolizm roślin przyczyniając się do zwiększenia plonów, w warunkach stresu – zmniejsza jego skutki.

LSA zmusza roślinę do zwiększonego poboru wapnia (Ca) z gleby.

OPRYSK DOLISTNY:

Najlepiej stosować mieszając ze środkami ochrony roślin.

	QUIX TOTAL
Uprawy przemysłowe i zboża (kukurydza, rzepak, pszenica, burak cukrowy, ziemniaki, pomidory przemysłowe itp.)	0,5-1,0 l/ha
Uprawy ogrodnicze (pomidory, ogórki, sałata, fasolka, papryka itp.)	150-250 ml/hl
Owoce	2-2,5 l/ha

Opakowania: 1, 5 i 25 litrów



J-Feed

NAWÓZ NPK W ŻELU

NOWA FORMA ŻELU ZWIĘKSZA EFEKTYWNOŚĆ ODŻYWIANIA ROŚLIN

Do stosowania w opryskach dolistnych (do mieszania z innymi opryskami dolistnymi) i w ferdygacji

% azotu przyswojonego dolistnie



O 31% NPK WIĘCEJ dociera do liścia z formy żelowej

J-FEED to innowacyjna linia odżywek dolistnych w ŻELU stworzona w celu zwiększenia efektywności wykorzystania składników odżywczych.

Preparaty w formie żelowej z serii **J-FEED** zawierają łatwo przyswajalne biostymulatory organiczne.

DZIAŁANIE:

- Zwiększa i usprawnia pobieranie składników odżywczych przez korzeń
- Ogranicza wymywanie najbardziej mobilnych składników w strefie korzenia
- Zwiększa zdolność wymiany kationów i zatrzymuje wodę w glebie
- Zawiera 4 różne formy AZOTU o różnym tempie przyswajania (azotanowy, aminowy, amidowy i azot organiczny)
- Praktyczny w użyciu: koncentrat żelowy, bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
- Zmniejsza wyptukiwanie azotu (N) z gleby o ponad 50%
- Ekstrakty organiczne w formie żelowej – naturalna biostymulacja

J-feed zalecany jest do mieszania z herbicydami, ponieważ zawarte w tym produkcie polisacharydy spełniają funkcję eliminującą stres.

ODŻYWIANIE DOLISTNE

GWARANTOWANY SKŁAD

	J-FEED N40		J-FEED 22.22.22		J-FEED 32.11.11		J-FEED 12.34.12		J-FEED 8.23.45	
	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w	% w/w
Azot (N) total:	30	40	15	22	23	32	8	12	5	8
(N) organiczny	1	1,4	1	1,5	1	1,4	1	1,5	1	1,5
(N) azotan	7	9,3	3,2	4,7	5	7	1	1,5		
(N) amoniakalny	7	9,3	3,2	4,7	5	7	1	1,5		
(N) amidowy	15	20	7,6	11,3	12	16,8	6	9	4	6,5
Fosfor pentaoxid (P ₂ O ₅) rozpuszczalny w wodzie			15	22	8	11	24	34	15	23
Tlenek potasu (K ₂ O) rozpuszczalny w wodzie			15	22	8	11	8	12	30	45
Kiślik zawartość chloru										
Węgiel organiczny (C) pochodzenia biologicznego	5	4	3	4,5	3	4,2	5	4,5	2,8	4
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie	1	1,4								

SPOSÓB UŻYCIA

UPRAWA	FERDYGACJA		DOLISTNIE	
	DAWKĄ	CZAS APLIKOWANIA	DAWKĄ	CZAS APLIKOWANIA
Uprawy przemysłowe i zboża (kukurydza, rzepak, burak cukrowy, pszenica, ziemniak itp.)	---	---	1-2,5 l/ha	minimum 1 oprysk
Uprawy ogrodnicze i kwiatowe (pomidory, ogórki, papryka, fasola itp.)	2-3 l / 1000 m ²	co 10-15 dni	200-250 ml/ha	co 10-15 dni
Orzechy i kwiaty owocowe (owoce jabłkowe, owoce pestkowe, truskawki, maliny itp.)	15-30 l/ha	co 10-15 dni	2,5 l/ha	co 10-15 dni

PRZEWAGA FORMY ŻELOWEJ

Skład chemiczny i formuła żelowa odżywek J-FEED zapewniają:

- Utrzymanie w strefie korzenia najbardziej mobilnych składników odżywczych (azot N, potas K)
- Odblokowanie nieprzyswajalnych form fosforu
- Poprawę struktury gleby (3% „próchnicy w żelu”)
- Ochronę mikroflory glebowej (niska zawartość chlorków)

Żelowe odżywki J-FEED zatrzymują większe ilości wody i jonów w strefie korzenia, z czego korzystają rośliny uprawne wydając stabilny plon.

Ekstrakty organiczne (aminokwasy, białka, kwasy humusowe oraz polisacharydy) wchodzące w skład odżywek z linii **J-FEED** gwarantują skuteczne odżywienie roślin i działają antystresowo np. w przypadku suszy, upału, chłodu, przymrozków, błędnych zabiegów środkami ochrony roślin itp.

Produkty zgodne z regulacjami WE 2003/2003 i D-Lgs 75/2010

Opakowania: butelka 1L, pojemnik 8L

UWAGA: wstrząsnąć przed użyciem



**Sprawdzona jakość
produktów
i najniższe ceny!**



Odwiedź nasz sklep internetowy, kupuj i oszczędzaj!

www.sklep.rudnikagro.pl





Siedziba firmy:

Rudnikagro Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin

tel. (+48) 91 461 25 64

fax. (+48) 91 460 03 50

e-mail: info@rudnikagro.pl

DZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:

Rafał Lis, tel. 781 600 022, e-mail: r.lis@rudnikagro.pl

Mateusz Świątek, tel. 781 600 023, e-mail: m.swiatek@rudnikagro.pl

DZIAŁ NAWOZÓW:

Piotr Griszke, tel. 607 810 800, e-mail: p.griszke@rudnikagro.pl

DZIAŁ ZBÓŻ:

Sebastian Lebiecki, tel. 781 900 045, e-mail: s.lebiecki@rudnikagro.pl

STRONA INTERNETOWA FIRMY:

www.rudnikagro.pl

SKLEP INTERNETOWY:

www.sklep.rudnikagro.pl

Oddział Lipiany

ul. Myśliborska 5a

74-240 Lipiany

tel. (+48) 91 579 31 61

fax. (+48) 91 564 53 06

Oddział Pyrzyce

ul. Stargardzka 8

74-200 Pyrzyce

tel./fax. (+48) 91 831 41 58

Oddział Banie

ul. Dworcowa 1

74-110 Banie

tel. (+48) 91 416 63 32

fax. (+48) 91 416 64 09