



KOMPLEKSOWA OBSŁUGA ROLNICTWA

KATALOG DOBREGO AGRONOMA
2023



Środki ochrony roślin Nawozy Materiał siewny Surowce rolne



Rudnikagro Sp. z o.o.
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
tel. (+48) 91 461 25 64
fax. (+48) 91 460 03 50
e-mail: info@rudnikagro.pl



Fungicydy



Herbicydy



Insektycydy



Regulatory wzrostu



Zaprawy



Zboża i materiał siewny



Nawozy, biostymulatory i preparaty mikrobiologiczne



Adiuwanty



Ubezpieczenia

Drodzy Klienci,

W Katalogu Dobrego Agronoma prezentujemy środki ochrony roślin, nawozy i inne produkty do produkcji rolnej. Największą część naszej oferty stanowią preparaty z handlu równoległego, cieszące się niestąbną popularnością wśród Odbiorców. Posiadamy ponad 80 produktów zarejestrowanych w uprawach rolniczych, sadowniczych oraz warzywnych i stale poszerzamy nasze portfolio.

21 lat działalności Rudnikagro jest dowodem dużego zaufania, jakim darzą firmę nasi Kontrahenci, a to daje nam największą satysfakcję. Dzięki Państwu realizujemy wyzwania, jakie stawia przed nami branża agro i to dla Was stale się rozwijamy. Zapraszamy do współpracy.

Prezes Zarządu
Mariusz Rudnicki

Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	protiokonazol 100 g/l, fluksastrobina 50 g/l, biksafen 40 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza plew, fuzarioza kłosów, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia
Dawka	1,0–1,25l/ha

Apron-X 190 EC

Produkt referencyjny Variano Xpro 190 EC



Aramis 300 SC jest fungicydem w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego w ochronie jabłoni przed parchem jabłoni i mączniakiem jabłoni oraz gruszy przed parchem gruszy.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza
Substancja aktywna	fluksapyroksad 300g/l
Zwalczane choroby	parch jabłoni, mączniak jabłoni, parch gruszy
Dawka	0,25l–0,3l/ha

Aramis 300 SC

Produkt referencyjny Sercadis 300 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Areva 200 EC

Produkt referencyjny Vertisan 200 EC



Areva 200 EC to środek grzybobójczy w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym, wgłębnym i lokalnie systemicznym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie zbóż przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień jary
Substancja aktywna	pentiopyrad 200g/l
Zwalczane choroby	brunatna plamistość liści, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, mączniak prawdziwy, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Dawka	1l/ha

Asturia Pro 71,6 WG

Produkt referencyjny Luna Care 71,6 WG



Fungicyd w formie rozpuszczalnych w wodzie granul (WG) do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu powierzchniowym i układowym. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna fluopyram zaliczana jest do grupy 7, natomiast substancja czynna fosetyl glinu zaliczana jest do grupy P07.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza sadowniczego.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza
Substancja aktywna	fluopyram 50 g/kg, fosetyl glinu 666 g/kg
Zwalczane choroby	parch jabłoni, parch gruszy, mączniak jabłoni na gruszy, brązowa plamistość gruszy (Stemphylium); działanie ograniczające: zaraza ogniowa, rak drzew owocowych, rak bakteryjny drzew owocowych
Dawka	jabłoń 2 kg/ha (0,67 kg na 1ha i każdy 1m wysokości korony drzewa), grusza 3 kg/ha (1,0 kg na 1 ha i każdy 1 m wysokości korony drzewa)

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Bolero 500 SC jest środkiem grzybobójczym w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w ochronie ziemniaka, marchwi, pietruszki korzeniowej, selera korzeniowego i buraka ćwikłowego.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak, marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, burak ćwikłowy
Substancja aktywna	fluazynam 500g/l
Zwalczane choroby	alternarioza, zaraza ziemniaka (nać i bulwy), alternarioza naci marchwi, alternarioza naci pietruszki, alternarioza buraka (liście)
Dawka	0,2–0,4l/ha

Bolero 500 SC

Produkt referencyjny Banjo 500 SC



Caspara 400 SC Fungicyd, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu powierzchniowym i wgłębnym, do stosowania zapobiegawczego.

Roślina chroniona	truskawka (uprawa w polu i pod osłonami), wiśnia, sałata głowiasta, sałata liściowa (uprawa w polu i pod osłonami), uprawy małoobsz (koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak, rośliny przyprawowe)
Substancja aktywna	izofetamid 400g/l
Zwalczane choroby	szara pleśń, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, zgnilizna twardzikowa
Dawka	0,9–1,2l/ha

Caspara 400 SC

Produkt referencyjny Kenja 400 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Demeter 250 SC


Produkt referencyjny Tazer 250 SC



Demeter 250 SC jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu wgłębnym i układowym, do stosowania głównie zapobiegawczego w zwalczaniu chorób grzybowych roślin rolniczych i warzywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych (pomidor pod osłonami).

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary, rzepak ozimy, kukurydza, ziemniak, fasola, kalafior, brokuł, pomidor
Substancja aktywna	azoksystrobina 250 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści, septorioza plew, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza karłowa jęczmienia, czerń zbóż, czerń krzyżowych, szara pleśń, sucha zgnilizna kapustnych, zgnilizna twardzikowa, żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy, alternarioza, rizoktonioza ziemniaka, rdza szparaga, purpurowa plamistość pędów, antraknoza fasoli, zaraza ziemniaka, mączniak prawdziwy pomidora, alternarioza pomidora
Dawka	0,5–3l/ha

Dife-Life



Dife-Life fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi. Substancją czynną środka jest difenokonazol (związek triazolowy – z grupy inhibitorów biosyntezy steroli – inhibitorów demetylacji SBI-DMI, wg FRAC Grupa 3).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia
Substancja aktywna	difenokonazol 250g/l
Dawka	0,2l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Eldorado to fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie przed chorobami grzybowymi.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto ozime, pszenżyto ozime
Substancja aktywna	benzowindyflupyr 75g/l, protriakonazol 150 g/l
Zwalczane choroby	rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż, ramularia, rdza jęczmienia.
Dawka	1l/ha

Eldorado

Produkt referencyjny Elatus Era



Graviole 38 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie jabłoni i gruszy przed chorobami przechowalniczymi: gorzką zgnilizną jabłek, gorzką zgnilizną gruszek oraz mokrą zgnilizną gruszek. Środek GRAVIOLE 38 WG stosuje się przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Roślina chroniona	jabłoni i grusza – choroby przechowalnicze
Substancja aktywna	boskalid 25,2% (252 g/kg), piraklostrobina 12,8% (128 g/kg)
Zwalczane choroby	gorzka zgnilizna jabłek, gorzka zgnilizna gruszek, mokra zgnilizna gruszek.
Dawka	0,8kg/ha

Graviole 38 WG

Produkt referencyjny Bellis 38 WG



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

LS Cypro-Fluido



LS Cypro-Fluido fungicyd, w postaci koncentratu w formie granul do sporządzania sawiesiny wodnej (WG), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym mechanizmie działania: cyprodynil – FRAC Grupa 9 i fludioksonil – FRAC Grupa 12.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	jabłoń, truskawka, malina, fasola szparagowa, groch, pomidor Uprawa małoobszarowa: czereśnia, wiśnia, grusza, pigwa, śliwa, morela, brzoskwinia, jeżyna, porzeczka czarna, czerwona i biała, borówka, żurawina, winorośl, groch siewny, marchew, pietruszka, seler korzeniowy i naciowy, cebula z dymki, czosnek, szalotka i wiele innych
Substancja aktywna	cyprodynil 375g/kg, fludioksonil 250g/kg
Zwalczane choroby	gorzka zgnilizna, szara pleśń, zamieranie pędów maliny, zgnilizna Twardzikowa fasoli, antraknoza fasoli, askochytoza grochu
Dawka	0,6–1,0kg/ha

Preiner

Produkt referencyjny Priaxor



Preiner jest fungicydem w formie koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej o działaniu układowym i translaminarnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi w: pszenicy ozimej, jęczmieniu jarym i ozimym, pszenżycie ozimym oraz w życie ozimym.

Roślina chroniona	pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	piraklostrobina 150 g/l, fluksapyroksad 75 g/l
Zwalczane choroby	brunatna plamistość liści zbóż, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, septorioza paskowana liści pszenicy, plamistość siatkowa jęczmienia, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, rdza brunatna, septorioza liści, rdza brunatna żyta,
Dawka	0,75–1,5l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Prescot 400SC Fungicyd, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC) o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Roślina chroniona	rzepak ozimy; zastos. małoobsz.: rzepak jary
Substancja aktywna	dimoksystrobina – 200 g/l, boskalid – 200 g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, szara pleśń
Dawka	0,5l/ha

Prescot 400 SC

Produkt referencyjny Pictor 400 SC



Prescot Active koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC), o działaniu translaminarnym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.


Roślina chroniona	rzepak ozimy, rzepak jary, zastosowanie małoobszarowe: rzepik ozimy, rzepik jary, gorczyca biała, gorczyca sarebska, gorczyca czarna, rzodkiew oleista, lnianka siewna, len zwyczajny, mak lekarski
Substancja aktywna	boskalid – 150g/l, piraklostrobina – 250g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa, mączniak rzekomy kapustnych, szara pleśń, alternarioza lnu, fomoza lnu, mączniak rzekomy maku, czarna plamistość maku
Dawka	0,6 – 1,0 l/ha

Prescot Active

Produkt referencyjny Pictor Active



Protio-Tebu-Life



Protio-Tebu-Life Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego w ochronie zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, pszenżyto jare, jęczmień ozimy, jęczmień jary, żyto
Substancja aktywna	protiokonazol 125g/l, tebukonazol 125g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza, plamistość siatkowa liści
Dawka	0,75 – 1,0l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Revolte 250 SC

Produkt referencyjny Revus 250 SC



Revolte 250 SC Fungicyd, wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczenia wodą (SC), o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego. Substancja czynna mandipropamid należy do grupy FRAC 40.

Roślina chroniona	ziemniak, pomidor, szpinak, botwina, burak liściowy, uprawy małoobsz (pomidor, oherżyna (bakłażan) uprawiane pod osłonami i w szklarniach, brokuł, kalafior, kapusta brukselska uprawiane w polu, cukinia uprawiana pod osłonami i w szklarniach i wiele innych)
Substancja aktywna	mandipropamid 250g/l
Zwalczane choroby	zaraza ziemniaka (nać i bulwy), mączniak rzekomy, fytoftorozoza
Dawka	0,6l/ha, wyjątek cykoria i chmiel – patrz etykieta

Rodeo 50 EW jest środkiem grzybobójczym, w formie emulsji oleju w wodzie, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego. Środek RODEO 50 EW stosuje się przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych lub opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary, jabłoń, grusza, winorośl, rośliny ozdobne uprawiane w szklarni
Substancja aktywna	cyflufenamid 50g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw; mączniak jabłoni, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy winorośli; dodatkowo w uprawie pszenżyta ogranicza występowanie brunatnej plamistości liści, rdzy brunatnej, septoriozy liści, w uprawie jęczmienia jarego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia, rdzy jęczmienia, rynchosporiozy zbóż, w uprawie jęczmienia ozimego ogranicza występowanie plamistości siatkowej liści jęczmienia, rynchosporiozy zbóż.
Dawka	0,1–0,5l/ha

Rodeo 50 EW

Produkt referencyjny Kendo 50 EW



Sendo 60 EC Fungicyd w formie rozpuszczalnego koncentratu (EC) do sporządzania roztworu wodnego o działaniu systemicznym do stosowania zapobiegawczego, interwencyjnego oraz wyniszczającego. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna metkonazol zaliczana jest do grupy 3 (fungicydy DMI).

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, rzepak ozimy
Substancja aktywna	metkonazol 60 g/l
Zwalczane choroby	septorioza paskowana liści i fuzarioza kłosów, sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń, cylindrosporioza
Dawka	0,7l–1,5l/ha

Sendo 60 EC

Produkt referencyjny Sirena 60 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Sextans 62,5 WG

Produkt referencyjny Switch 62,5 WG



Sextans 62,5 WG jest środkiem grzybobójczym, koncentratem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu wgłębnym i powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób jabłoni, gruszy, pigwy, czereśni, wiśni, śliwy, moreli, brzoskwiń, nektarynki, truskawek, maliny, jeżyny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, borówki amerykańskiej, żurawiny, winorośli, fasoli szparagowej, fasoli na zbiór świeżych nasion, fasoli na suche nasiona, grochu zwyczajnego na świeże nasiona, grochu siewnego cukrowego, grochu jadalnego na suche nasiona, bobu, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, cebuli, szalotki, czosnku, cebuli z dymki, szczypiorku, salsefii, selera korzeniowego, szparagów, marchwi, pietruszki korzeniowej, pasternaka, buraka ćwikłowego, chrzanu, brukwi, rzepy, tytoniu, szkółek drzew owocowych i ozdobnych, szkółek i upraw leśnych, plantacji nasiennych roślin warzywnych, zielarskich i ozdobnych, uprawianych w gruncie, pod osłonami i w szklarni: selera naciowego, sałaty głowiastej i liściowej, cykorii sałatowej, endywii, botwinki, szpinaku, roślin zielarskich oraz ozdobnych oraz uprawianych pod osłonami i w szklarni pomidora, ogórka, bakłażana, cukinii i papryki.

Środek Sextans 62,5 WG przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, sadowniczych i opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	sady, drzewa pestkowe, warzywa, owoce miękkie, jagodowe i inne; inne uprawy warzywne i rośliny ozdobne
Substancja aktywna	cyprodynil 375 g/kg, fludioksonil 250 g/kg
Zwalczane choroby	szara pleśń, zamieranie pędów, zgnilizna twardej, antraknoza, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, gorzka zgnilizna, mokra zgnilizna, brunatna zgnilizna i inne
Dawka	0,6kg-1kg/ha

Silvestro 250 EC

Produkt referencyjny Protendo Extra



Silvestro 250 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego oraz wyniszczającego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i jare, jęczmień ozimy i jary, żyto
Substancja aktywna	protriakonazol 125g/l, tebukonazol 125g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzarioza kłosów, czerń zbóż, rynchosporioza zbóż, rdza jęczmienia, plamistość siatkowa liści
Dawka	0,75-1,0l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Spector 33 WG jest fungicydem w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych i sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	groch pastewny, groch siewny, łubin wąskolistny, biały i żółty, malina, czarna porzeczka, truskawka, wiśnia, inne warzywa i owoce
Substancja aktywna	piraklostrobina 67g/kg, boskalid 267g/kg
Zwalczane choroby	mączniak rzekomy, alternarioza, ogranicza występowanie stemphylium, czerń krzyżowych, szara pleśń, alternarioza naci, mączniak prawdziwy, zaraza ziemniaka, alternarioza, biała plamistość liści truskawki, mączniak prawdziwy truskawki, brunatna zgnilizna drzew pestkowych, rdza pora, fytoftoroza pora, alternarioza pora, rizoktonioza
Dawka	0,5–1,8kg/ha

Spector 33 WG

Produkt referencyjny Signum 33 WG



Tarot 200 EC i Tarot Pro 200 EC to środki grzybobójcze w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w zwalczaniu chorób grzybowych pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej i jęczmienia jarego. Proquinazid należy do grupy chemicznej chinazolin. Między innymi zapobiega rozwojowi mączniaka prawdziwego zbóż i traw poprzez zahamowanie kiełkowania zarodników grzyba. Środek indukuje naturalną odporność roślin. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary
Substancja aktywna	proquinazid 200 g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, septorioza plew, brunatna plamistość liści, fuzaryjna zgorzel podstawy źdźbła, plamistość siatkowa, rdza jęczmienia
Dawka	0,15–0,25l/ha

Tarot 200 EC Tarot Pro 200 EC

Produkt referencyjny Talius 200 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Tarot Sad 200 EC

Produkt referencyjny Talius Sad



Tarot Sad 200 EC Fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym, do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego. Substancja czynna środka należy wg. FRAC do grupy 13.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza
Substancja aktywna	proquinazid 200g/l
Zwalczane choroby	mączniak jabłoni, mączniak jabłoni (na gruszy)
Dawka	0,2-0,3/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Tauron 240 EC

Produkt referencyjny Tilmor 240 EC



Tauron 240 EC to środek grzybobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie rzepaku ozimego i jarego przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

Środek wykazuje dodatkowo korzystny wpływ na rozwój roślin rzepaku. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	rzepak ozimy i jary
Substancja aktywna	protiokonazol 80 g/l, tebukonazol 160 g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych, czern krzyżowych, mączniak rzekomy, szara pleśń
Dawka	0,75-1l/ha

Tavares Fungicyd w formie zawiesino-emulsji (SE), o działaniu układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych z zamkniętą kabiną dla operatora.

Roślina chroniona	rzepak ozimy, rzepak jary, kukurydza; zastos. małoobsz.: gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzodkiew oleista, stonecznik, mak lekarski, kukurydza cukrowa
Substancja aktywna	fluopyram – 125 g/l, protiokonazol – 125 g/l
Zwalczane choroby	zgnilizna twardzikowa, czern krzyżowych, szara pleśń, żółta plamistość liści kukurydzy, drobna plamistość liści kukurydzy i inne
Dawka	1 l/ha

Tavares 250 SE

Produkt referencyjny Propulse 250 SE



Tizen Fungicyd w postaci płynu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu powierzchniowym i układowym, do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w zwalczaniu chorób powodowanych przez grzyby. Środek zawiera dwie substancje czynne o różnym sposobie i mechanizmie działania: proquinazid z grupy chinazolin (wg FRAC grupa 13) i protiokonazol z grupy triazoli (wg FRAC grupa 3.)

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	protiokonazol 200g/l, proquinazid – 50 g/l
Zwalczane choroby	łamliwość źdźbła zbóż i traw, mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, septoriozy liści, plamistość siatkowa jęczmienia, rynchosporioza zbóż
Dawka	0,75– 1 l/ha

Tizen

Produkt referencyjny Verben



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Trident 375 SC

Produkt referencyjny Toprex 375 SC



Trident 375 SC Fungicyd i regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu zapobiegawczym i interwencyjnym, przeznaczony do stosowania w celu zapobiegania nadmiernemu wyrastaniu roślin i ich wyleganiu oraz w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek zawiera dwie substancje czynne z grupy triazoli, w tym difenokonazol związek grzybobójczy należący do grupy inhibitorów syntezy steroli – inhibitorów demetylacji, SBI – DMI (wg FRAC Grupa 3).

Roślina chroniona	rzepak ozimy (regulacja wzrostu, przeciwdziałanie wyleganiu)
Substancja aktywna	difenokonazol 250g/l, paklobutrazol 125g/l
Zwalczane choroby	sucha zgnilizna kapustnych (średni poziom zwalczania), biała plamistość liści rzepaku – cylindrosporioza (średni poziom zwalczania)
Dawka	wiosna – 0,3l/ha, jesień – 0,35l/ha

Vivero 500 SC Vivero Duo 500 SC

Produkt referencyjny Vivando



Vivero 500 SC i Vivero Duo 500 SC to fungicydy w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu powierzchniowym i układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie pomidora, bakłażana, papryki, ogórka, cukinii, melona w uprawie pod osłonami oraz pieczarki w pieczarkarniach przed chorobami grzybowymi. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, plecakowych i półkowych. Środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach/pieczarkarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Roślina chroniona	pieczarka – w uprawie pod osłonami typu pieczarkarnia, pomidor, bakłażan, papryka, ogórek, cukinia, melon – w uprawie pod osłonami typu szklarnia
Substancja aktywna	metrafenon 500g/l
Zwalczane choroby	mączniak prawdziwy pomidora, mączniak prawdziwy, mączniak prawdziwy dyniowatych, daktylium
Dawka	0,04–0,3l/ha; pieczarka – 1ml/m ² podłoża

Rejestracja własna Rudnikagro

**Herbicyd przeznaczony do ochrony
burak cukrowego, pastewnego
i ćwikłowego.**

Tarracco® 700 SC zwalcza m.in.:

*fiotka polnego
gorczycę polną
gwiazdnicę pospolitą
komosę białą
przytulię czepną
rdest plamisty
tasznika pospolitego
tobółki polne*



Agat 480 SC

Produkt referencyjny Goal 480 SC



Agat 480 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu kontaktowym. Po aplikacji na powierzchnię gleby tworzy warstwę nad jej powierzchnią, dzięki czemu kiełkujące chwasty zamierają stykając się ze środkiem. Bezpośredni kontakt środka z liśćmi rosnących chwastów powoduje również ich zamieranie. Substancja czynna oksyfluorofen zaliczana jest do inhibitorów oksydazy protoporfirynogenowej (PPO). W roślinie powoduje zahamowanie syntezy chlorofilu. Światło uaktywnia biologiczne działanie oksyfluorofenu. Objawy działania środka pojawiają się krótko po wykonaniu oprysku. W miejscu kontaktu środka z rośliną następuje szybkie odwodnienie tkanek, następnie pojawiają się chlorotyczne plamy przypominające swoim wyglądem poparzenia i nekrozy, co prowadzi do szybkiej śmierci roślin. Całkowity efekt działania środka (zasychanie roślin) występuje po około 7 dniach od wykonania zabiegu. Środek stosować tylko na chwasty w fazie liścieni do fazy 1 pary liści.

Roślina chroniona	cebula uprawiana z siewu
Substancja aktywna	oksyfluorofen 480g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, wilczomlecz obrotny. chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, żółtlica drobnokwiatowa chwasty odporne: samosiewy rzepaku.
Dawka	0,05l/ha

Aria 100 EC

Produkt referencyjny Agil-S 100 EC



Aria 100 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych. Aria 100 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów powodującym zahamowanie wzrostu i rozwoju rośliny. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, cebula, groch, fasola, kapusta głowiasta, marchew, pietruszka, truskawka i uprawy małoobsz.
Substancja aktywna	propachizafop 100g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, paluszniak krwawy, perz właściwy, samosiewy zbóż, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Dawka	0,5-1,5l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Artegon 450 WG to herbicyd selektywny o działaniu układowym, w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej (WG), stosowany nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna aminopyralid do grupy O. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym, uzupełniającym się sposobie działania. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów, zaś substancja czynna aminopyralid powoduje blokadę auksyn, tj. hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin. Ponadto, zakłóca proces oddychania na poziomie komórkowym. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza w warunkach ciepłej i wilgotnej pogody działanie środka jest szybsze, natomiast w warunkach niskich temperatur (około 5°C) zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobowa w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2–6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	florasulam 150g/kg, aminopyralid 300 g/kg
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: fiołek polny powyżej fazy 5 liści (BBCH 15), jasnota purpurowa, ostróżeczka wschodnia chwasty wrażliwe: ambrozja bylicolistna, fiołek polny do fazy 5 liści (BBCH 15), komosa biała, maruna bezwonna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), samosiewy rzepaku, samosiewy słonecznika, tobołki polne chwasty średniowrażliwe: ostrożeń polny, przytulia czepna, rumian polny
Dawka	25–33g/ha

Asterix 315 SC jest herbicydem, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym dogłębowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów rocznych jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy. Środek Asterix 315 SC zawiera 2 wzajemnie uzupełniające się substancje czynne należące do różnych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.

Tienkarbazon metylu jest inhibitorem syntazy acetylomleczanowej (ALS) – enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC tienkarbazon metylu zaliczany jest do grupy B. Izoksafutol jest inhibitorem enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę barwników fotoaktywnych, co w konsekwencji powoduje zamieranie chloroplastów w komórkach roślin. Zgodnie z klasyfikacją HRAC izoksafutol zaliczany jest do grupy F2.

Asterix 315 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest zarówno poprzez korzenie jak i również przez todygi i liście kiełkujących chwastów. Po zastosowaniu środka chwasty nie wschodzą lub krótko po wschodach bieleją, przestają rosnąć i zamierają.

Dobre uwilgotnienie gleby sprzyja wysokiej aktywności środka w glebie oraz pozwala na utrzymanie jego aktywności w możliwie długim okresie czasu. W warunkach suszy skuteczność środka może być znacznie ograniczona w wyniku braku możliwości przedostania się substancji czynnych do systemu korzeniowego chwastów.

Roślina chroniona	kukurydza
Substancja aktywna	tienkarbazon metylu – 90 g/l, izoksafutol – 225 g/l; sejfnier: cyprosulfamid – 150 g/l
Zwalczane chwasty	chwasznica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, rdest powojowaty, rdest ptasi, rumian pospolity, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, włośnice.
Dawka	0,33–0,44 l/ha

Artegon 450 WG

Produkt referencyjny Dragon 450 WG



Asterix 315 SC

Produkt referencyjny Adengo 315 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Astor 360 SL

Produkt referencyjny Navigator 360 SL



Astor 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Astor 360 SL pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie do stref wzrostowych rośliny. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne chlopyralid, pikloram i aminopyralid zaliczone są do grupy O.

Roślina chroniona	rzepak ozimy
Substancja aktywna	chlopyralid – 240 g/l, pikloram – 80 g/l, aminopyralid – 40 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty), samosiewy grochu Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, przytulia czepna, Chwasty średnioodporne: jasnota purpurowa, tasznik pospolity Chwasty odporne: przetacznik perski
Dawka	0,2 l/ha

Basetto

Produkt referencyjny Belkar



Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne: halauksyfen metylu oraz pikloram zaliczone są do grupy O.

Środek pobierany jest poprzez liścienie i liście chwastów, a następnie szybko przemieszcza się w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Objawy wizualne zależą od gatunków chwastów i mogą pojawić się od kilku dni do kilku tygodni po zabiegu. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 – 6 liści.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	halauksyfen metylu – Arylex™ 10g/l, pikloram 48g/l
Zwalczane chwasty	Dawka 0,25 l/ha Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity, Chwasty średnio wrażliwe: maruna bezwonna, mak polny, stulicha psia, tobołki polne Chwasty odporne: gwiazdnica pospolita, przetacznik perski, fiołek polny Dawka 0,5 l/ha Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, dymnica pospolita, komosa biała, jasnota biała, jasnota różowa, mak polny, maruna bezwonna, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: gwiazdnica pospolita Chwasty odporne: fiołek polny, przetacznik perski
Dawka	25–33g/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Benta Duo 480 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednolrotnych chwastów dwuliściennych w ziemniaku, fasoli, grochu jadalnym na suche nasiona oraz grochu jadalnym zielonym.

Roślina chroniona	ziemniak, fasola, groch jadalny zielony, groch jadalny na suche nasiona
Substancja aktywna	bentazon 480g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, maruna bezwonna, przytulia czepna, rdest plamisty, rdest powojowy, rumian polny, tasznik pospolity, tobołki polne, żóttlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, przetacznik polny, wilczomlecz obrotowy. Chwasty średnioodporne: chwastnica jednostronna, samosiewy rzepaku oraz chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.
Dawka	2,5-3l/ha

Benta Duo 480 SL

Produkt referencyjny Basagran 480 SL



Bingo 600 SC Herbicyd selektywny, o działaniu kontaktowym, występującym w formie koncentratu do sporządzania zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna aklonifen zaliczana jest do grupy F3. Herbicyd stosowany doglebowo, tworzący po aplikacji na jej powierzchni jednolitą powłokę. Pobierany jest poprzez liście oraz koleoptyl chwastów. Najlepiej działa na chwasty w trakcie ich kietkowania i wschodów, gdy chwasty znajdują się w fazie liści. W roślinie blokuje wytwarzanie chlorofilu. Środek pozostaje aktywny przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z czym zwalcza zachwaszczenie wtórne. Nierównomierne pokrycie oraz złe przygotowanie powierzchni gleby może obniżyć skuteczność działania środka. Na glebach gliniastych i piaszczystych środek można stosować przed i po wschodach rośliny uprawnej, a na glebach organicznych tylko po wykietkowaniu rośliny uprawnej.

Roślina chroniona	ziemniak, uprawy małoobsz. takie jak groch zwyczajny (uprawiany na suche nasiona), marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, czosnek i inne
Substancja aktywna	aklonifen 600 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała Chwasty średnio wrażliwe: rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty). Chwasty odporne: iglica pospolita
Dawka	2,5-3l/ha

Bingo 600 SC

Produkt referencyjny Bandur 600 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Bresser 4D

Produkt referencyjny Biathlon 4D



Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie, występującym w postaci granul do sporządzenia zawiesiny wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne tritosulfuron i florasulam zaliczane są do grupy B.

Środek zawiera substancje czynne tritosulfuron i florasulam zaliczane do inhibitorów działania syntazy acetylmleczanowej (ALS/AHAS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek, a tym samym zahamowania wzrostu oraz rozwoju chwastów. Bresser 4D jest herbicydem pobieranym przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany jest w roślinie.

Wyższa wilgotność gleby i powietrza zwiększa skuteczność działania środka. W czasie suchej pogody oraz niedostatecznej wilgotności wchłanianie środka może zostać nieznacznie obniżone. W tym przypadku zaleca się zastosowanie herbicydu w mieszaninie z adiuwantem Dash HC.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary, owies jary, pszenica ozima durum, pszenica oplewiona (orkisz), owies ozimy, żyto jare, pszenżyto jare
Substancja aktywna	tritosulfuron 71,4% (714 g/kg), florasulam 5,4% (54 g/kg).
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, rumian polny, rumianek pospolity, rumianek bezpromieniowy, ostróżeczka polna, powój polny, poziomnik szorstki, przytulia czepna, rdest powojowy, samosiewy rzepaku, skrytek polny, stulicha psia, tasznik pospolity, tobołki polne, wyka ptasia. Chwasty średnio wrażliwe: blekot pospolity, jasnota różowa, jasnota purpurowa, komosa biała, niezapominajka polna, ostrożeń polny, przetacznik perski, przetacznik bluszczowy, przetacznik rolny, rdest ptasi Chwasty odporne: bodziszek drobny, fiołek polny, fiołek trójbarwny
Dawka	0,25–0,5l/ha

Castellar / Castille

Produkt referencyjny: Butisan 400SC



Castellar i Castille to herbicydy, są środkami chwastobójczymi w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanymi dogłębowo lub nalistnie, przeznaczonymi do zwalczania jednoliciennych chwastów jednoliciennych i dwuliciennych w rzepaku ozimym i rzepaku jarym. Środki przeznaczone do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	rzepak ozimy, rzepak jary
Substancja aktywna	metazachlor 400g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna, rumianek pospolity, stulicha psia, tasznik pospolity, wyczyniec polny. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, rdestowka powojowata (rdest powojowaty). Chwasty odporne: chwasty wieloletnie i głęboko korzeniące się.
Dawka	2,5l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Chlomaz-Life Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany dogłębowo, w formie zawiesiny kapsuł. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy F3. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów syntezy karotenoidów. Pobierany jest przez korzenie i pędy chwastów. Działa głównie w okresie ich kiełkowania. Po zastosowaniu środka brak jest wschodów chwastów lub po wschodach bieleją i zasychają

Roślina chroniona	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, Uprawy małoobszarowe: marchew, chrzan, bób, bobik, groch zielony, peluszką, soja, fasola szparagowa, brokuł, kalafior, kapusta głowiasta biała i czerwona, brukselka, kapusta pekińska
Substancja aktywna	chlomazon – 360 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, jasnota purpurowa, krzywoszyj polny, poziomnik szorstki, przytulina czepna, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, szarłat szorstki, rdest powojowy, rdest ptasi, pokrzywa żegawka, dymnica pospolita, rumian polny, psianka czarna, maruna bezwonna. Chwasty średnioodporne: żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty odporne: fiłek polny, rdest plamisty.
Dawka	0,25 – 0,33 l/ha



Środek chwastobójczy w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednorocznych chwastów jedno- i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Corvus jest środkiem chwastobójczym zawierającym trzy substancje czynne: metazachlor, aminopyralid oraz pikloram. Pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie liścieni do fazy 2 liści.

Roślina chroniona	rzepak ozimy
Substancja aktywna	metazachlor 500 g/l; aminopyralid 5,3 g/l; pikloram 13,3 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, rumianek pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: fiłek polny, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulina czepna, stulisz lekarski, tasznik pospolity. Chwasty średnioodporne: tobołki polne.
Dawka	1,5 l/ha

Corvus

Produkt referencyjny Kliper



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Difenikan 500 SC

Produkt referencyjny Diflanil 500 SC



Difenikan 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do jesiennej zwalczania chwastów dwuliściennych (głównie fiołka polnego) w pszenicy ozimej oraz w sady jabłoniowych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona	pszenica ozima, sady jabłoniowe
Substancja aktywna	diflufenikan 500 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: pszenica: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, tasznik pospolity; sady: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, tasznik pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: pszenica: przetacznik perski, przytulia czepna; sady: jasnota purpurowa, starzec zwyczajny, przetacznik perski, przytulia czepna.
Dawka	pszenica 0,3l/ha; sady 0,6l/ha

Etos 500 SC

Produkt referencyjny Kemiron Koncentrat 500 SC



Etos 500 SC jest środkiem chwastobójczym, w postaci koncentratu w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym dogłębowo lub nalistnie w mieszankach z innymi herbicydami. Środek przeznaczony jest do zwalczania chwastów jednorocznych w uprawie buraka cukrowego. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Etos 500 SC pobierany jest przez chwasty dwuliścienne głównie poprzez korzenie, a w mniejszym stopniu poprzez liście. Chwasty jednoliścienne pobierają środek głównie poprzez część podliścienną i w mniejszym stopniu poprzez korzenie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kielkowania i krótko po wschodach (faza liścieni). Preparat zaleca się stosować 3 krotnie każdorazowo w fazie siewek chwastów w mieszaninie z innymi herbicydami.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak pastewny (plantacje produkcyjne i nasienne)
Substancja aktywna	etofumesat 500g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik perski, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne; samosiewy rzepaku (kielkujące z nasion w stadium liścieni), szarłat szorstki chwasty średniowrażliwe: chwastnica jednostronna, maruna bezwonna, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, rdest ptasi, chwasty odporne: perz właściwy
Dawka	0,2l/ha x 3 zabiegi; możliwa mieszanina z innymi herbicydami
Mieszanie	Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha (dawki dzielone) Etos 500 SC 0,2l/ha + Kemifam Super Koncentrat 320 EC 1l/ha + Goltix 700 SC (dawki dzielone) 1l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Expose 56 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Roślina chroniona	jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto
Substancja aktywna	metrybuzyna 140 g/kg, flufenacet 420 g/kg
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, przetacznik perski, samosiewy rzepaku, rumian polny, tasznik pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna
Dawka	pszenica 0,3l/ha; sady 0,6l/ha

Expose 56 WG

Produkt referencyjny Expert Met 56 WG



Flanker 120 EC jest herbicydem w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach).

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna kletodym została zaklasyfikowana do grupy A. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Roślina chroniona	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, marchew, cebula, kapusta głowiasta, truskawka i uprawy małoobsz.
Substancja aktywna	kletodym 120g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Dawka	0,8l-2l/ha

Flanker 120 EC

Produkt referencyjny Select Super 120 EC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Flash 069 EW

Produkt referencyjny Foxtrot 069 EW



Flash 069 EW jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (olej w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania wybranych rocznych chwastów jednoliściennych w pszenicy ozimej, pszenicy ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Środek Flash 069 EW stosuje się przy użyciu opryskiwaczy polowych

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień jary, pszenica jara
Substancja aktywna	fenoksaprop-P 69g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, miotła zbożowa, rumian polny, komosa biała, mak polny, rdestówka powojowata, fiołek polny chwasty odporne: przytulia czepna
Dawka	1-1,2l/ha, z adiuwantem 0,5l/ha

Foster Forte 150 EC

Produkt referencyjny Fusilade Forte 150 EC



Foster Forte 150 EC jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluaazyfop-P-butyłowy została zaklasyfikowana do grupy A. Foster Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów.

Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka. Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Foster Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu.

Roślina chroniona	burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy, uprawy małoobsz (burak pastewny, rzepak jary, cebula, marchew, papryka i inne warzywa, wiśnia, porzeczka i inne owoce, inne rośliny)
Substancja aktywna	fluaazyfop-P-butyłowy 150 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż – dawka 0,63 – 0,83 l/ha; miotła zbożowa, wyczyniec polny – dawka 0,83 l/ha; perz właściwy – dawka 1,7l/h

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Foxydo 100 EC Herbicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego oraz chwastów jednoliściennych (w tym chwastnicy jednostronnej) po wschodach w buraku cukrowym, rzepaku ozimym i rzepaku jarym, w stoneczniku, ziemniaku, lnie oraz w grochu jadalnym zielonym, grochu jadalnym na suche nasiona, bobie, soi, fasoli szparagowej, marchwi, sałacie głowiastej, porze, cebuli siedmioletce, kalafiorze, szpinaku, a także w truskawce, plantacjach nasiennych lucerny, roślinach ozdobnych i w odmianach kukurydzy tolerancyjnych na substancję czynną cykloksydym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, lub sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową.

Roślina chroniona	burak cukrowy, rzepak ozimy, ziemniak, groch siewny oraz uprawy małoobszarowe
Substancja aktywna	cykloksydym - 100 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, palusznik krwawy, proso, stokłosa płonna, sorgo alepskie (na środek w dawce 4,0 l/ha), samosiewy zbóż, stokłosa polna, wiechlina zwyczajna, włośnica zielona, włośnica ber, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, życica trwała. Chwasty średnio wrażliwe: jęczmień płożny, perz właściwy (do fazy pierwszego kolanka 31 BBCH) (na środek w dawce 4,0-5,0 l/ha) Chwasty odporne: rośliny dwuliścienne.
Dawka	1-2 l/ha; dopuszczalna do 5 l/ha

Foxydo 100 EC

Produkt referencyjny Focus Ultra 100 EC



Keppler 502,4 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych środków przeznaczonych do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	groch jadalny zastosowanie małoobszarowe: bobik, bób, soja na suche nasiona, lucerna siewna, lucerna nerkowata, lucerna sierpowata, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna krwistoczerwona (inkarnatka), esparceta siewna
Substancja aktywna	bentazon – 480 g/l, imazamoks 22,4 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, przetacznik bluszczykowy, przetacznik rolny, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, wilczomlecz obrotowy. Chwasty średnio odporne: rdest ptasi.
Dawka	1,0 – 1,25 l/ha

Keppler 502,4 SL

Produkt referencyjny: Corum 502,4 SL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Kojot 306 SE

Produkt referencyjny: Mustang 306SE



Kojot 306 SE jest herbicydem zawierającym dwie substancje czynne: florasulam oraz 2,4-D (tzn. w formie estru etyloheksylowego). Kojot 306 SE jest herbicydem o działaniu układowym, pobierany jest przez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując jej deformację i zahamowanie wzrostu, co w efekcie powoduje zamieranie całego chwastu. Florasulam blokuje działanie enzymów podczas syntezy aminokwasów; 2,4-D hamuje działanie hormonów roślinnych odpowiedzialnych za wzrost roślin oraz zakłóca proces rozwoju komórek. W warunkach optymalnych, to jest podczas ciepłej i wilgotnej pogody efekt działania środka Kojot 306 SE jest szybszy, w warunkach niskich temperatur (około 5°C) całkowite zniszczenie chwastów następuje po około 3 tygodniach. Środek zwalcza chwasty, gdy minimalna temperatura dobową w ciągu 6 dni po wykonaniu zabiegu wynosi powyżej 5°C.

Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2-6 liści. Przytulię czepną zwalcza skutecznie do wysokości 20 cm, a chwasty rumianowate do wysokości 25 cm.

Preparat skutecznie niszczy chwasty odporne na atrazynę np.: komosa biała, psianka czarna, szarłat szorstki.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, pszenica jara, pszenżyto jare, mieszanki zbożowe (z wyłączeniem owsa).
Substancja aktywna	florasulam 6,25g/l, 2,4-D 300g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przytulia czepna (do fazy 7-8 okółków), psianka czarna, rdest kolankowy, rdest powojowy, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: bratek polny, dymnica pospolita, ostrożeń polny, przetacznik bluszczowy, przytulia czepna (od fazy 9 okółków). Chwasty średnio odporne: jasnota purpurowa. Chwasty odporne: czyściec błotny, krwawnik pospolity, chwasty jednoliścienne.
Dawka	0,4 – 0,6l/ha

Komandos 560 SC

Produkt referencyjny: Komplet 560 SC



Komandos 560 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym dogłębowo lub nalistnie, przeznaczonym do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Środek zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje aktywne o różnym sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez korzenie kielkujących chwastów, a zastosowany po wschodach chwastów wchłaniany jest także przez ich liście, natomiast flufenacet pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kielkujących chwastów. Diflufenikan i flufenacet pozostają aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kielkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto.
Substancja aktywna	diflufenikan 280 g/l, flufenacet 280 g/l
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe np: chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, mak polny, maruna bezwonna, miotła zbożowa, niezapominajka polna, poziomnik szorstki, przetacznik perski, przetacznik polny, przetacznik trójlistkowy, przytulia czepna, rdest powojowy, rumian polny, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku (jesienne wschody), tasznik pospolity, tobołki polne, wyka kosmata. chwasty średnio wrażliwe np: bodziszek drobny, przetacznik bluszczowy.
Dawka	0,4-0,5l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Laserto 050 SC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B. Laserto 050 SC jest herbicydem zaliczanym do inhibitorów działania enzymu – syntetazy acetylomlęczanowej (ALS), biorącego udziału w biosyntezie aminokwasów, co w konsekwencji powoduje zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Produkt pobierany jest przez liście i szybko przemieszczany do innych części rośliny. Efekt działania pojawia się po kilku dniach.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies
Substancja aktywna	florasulam 50g/l
Zwalczane chwasty	Zboża ozime – dawka 0,1 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, mak polny, maruna bezwonna, niezapominajka polna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowy (syn. rdestówka powojowata). Chwasty średnio odporne: chaber bławatek, jasnota purpurowa, przetacznik perski, rdest ptasi. Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny Zboża jare – dawka 0,1 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, gorczyca polna, maruna bezwonna, rdest powojowy (rdestówka powojowata), żóltlica drobnokwiatowa, przetacznik perski, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne. Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, rdest plamisty, poziomnik szorstki. Chwasty średnio odporne: komosa biała, fiołek polny, jasnota purpurowa. Chwasty odporne: bodziszek drobny Zboża jare – 0,08 l/ha Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, rdest powojowy (rdestówka powojowata), żóltlica drobnokwiatowa, przetacznik perski Chwasty średnio wrażliwe: przytulia czepna, chaber bławatek Chwasty odporne: fiołek polny, komosa biała, bodziszek drobny
Dawka	0,08–0,1 l/ha

Laserto D 550 SC Herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna florasulam zaliczana jest do grupy B, a substancja czynna diflufenikan zaliczana jest do grupy F1.

Herbicyd zawierający dwie biologicznie czynne substancje o odmiennych mechanizmach działania. Substancja czynna florasulam blokuje działanie enzymów roślinnych – aminokwasów syntetazy acetylomlęczanowej (ALS), co powoduje w konsekwencji zahamowanie wzrostu oraz rozwoju chwastów. Pierwsze efekty działania pojawiają się po kilku dniach.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime
Substancja aktywna	diflufenikan 500g/l, florasulam 50g/l
Zwalczane chwasty	Stosowanie środka na jesieni (dawka środka: 75 ml/ha) Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, mak polny, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest ptasi, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku Stosowanie środka na wiosnę (dawka środka: 100 ml/ha) Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chaber bławatek, dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, łoścyga pospolita, mak polny, ostrożeń polny, ostróżeczka polna, poziomnik szorstki, przetacznik polny, przymiotno kanadyjskie, przytulia czepna, rdestówka powojowata (syn. rdest powojowy) rumian polny, rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne, żóltlica drobnokwiatowa. Chwasty średniowrażliwe: samosiewy rzepaku, powój polny, łoboda rozłożysta. Chwasty średnioporne: komosa biała.
Dawka	75–100 ml/ha

Laserto 050 SC

Produkt referencyjny Saracen 050 SC



Laserto D 550 SC

Produkt referencyjny Saracen Delta 550 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Meteor 500 SC

Produkt referencyjny: Metazanex 500 SC



Meteor 500 SC to środek chwastobójczy, koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowany doglebowo lub nalistnie, przeznaczony do zwalczania jednolściennych chwastów jednolściennych i dwulściennych w rzepaku ozimym, rzepaku jarym, kapuście głowiastej i kalaforze. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	rzepak ozimy, rzepak jary, kapusta biała głowiasta, kalafor
Substancja aktywna	metazachlor 500 g/l
Zwalczane chwasty	Środek pobierany jest poprzez korzenie kiełkujących chwastów i niszczy je przed wschodami. Działa również na chwasty po wschodach do fazy pierwszej pary liści. Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, rumian polny, tasznik pospolity, żóttlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, przytulia czepna, tobołki polne. Chwasty odporne: ostrożeń polny.
Dawka	2l/ha

Meteor Star 416 SC

Produkt referencyjny Butisan Star 416SC



Meteor Star 416 SC jest herbicydem w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednolściennych chwastów jednolściennych i dwulściennych w rzepaku ozimym. Maksymalna efektywność środka uzyskuje się stosując przed wschodami chwastów.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	Rzepak ozimy
Substancja aktywna	metazachlor 333 g/l, chinomerak 83 g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna (do fazy dwóch liści), miotła zbożowa, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, przetacznik polny, przytulia czepna (do fazy liścienia), szarłat szorstki, rumianek pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, komosa biała, mak polny (do fazy dwóch liści), tasznik pospolity. Chwasty odporne: samosiewy zbóż, fiołek polny
Dawka	2,5 – 3l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Meteor Top 500 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania jednolrotnych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	rzepak ozimy
Substancja aktywna	metazachlor 375g/l, chinomerak 125g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, maruna bezwonna, przetacznik bluszczowy, przetacznik perski, przytulia czepna, rumianek pospolity, tasznik pospolity. Chwasty średnio wrażliwe: chwastnica jednostronna, komosa biała, mak polny, miotła zbożowa, szarłat szorstki, wiechlina roczna, wyczyniec polny. Chwasty odporne: dymnica pospolita, fiołek polny, rumian polny, tobołki polne.
Dawka	2,0 l/ha

Meteor Top 500 SC

Produkt referencyjny Sultan Top 500SC



Nabos 50 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granulatu, do sporządzania zawiesiny wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i buraku pastewnym. Środek Nabos 50 WG wykazuje selektywność czynną tzn. buraki posiadają zdolność rozkładu preparatu do związków nieaktywnych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak pastewny
Substancja aktywna	triflusaluron metylowy 500g/kg
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdestówka powojowata (rdest powojowaty) Chwasty średnioodporne: fiołek polny Chwasty odporne: łoboda rozłożysta
Dawka	30g/ha

Nabos 50 WG

Produkt referencyjny Safari 50 WG



Nokaut 75 WG

Produkt referencyjny Mocarz 75 WG



Nokaut 75 WG jest selektywnym herbicydem systemicznym pobieranym przez liście chwastów. W warunkach sprzyjających działaniu środka (ciepła i wilgotna pogoda) pierwsze objawy działania pojawiają się po upływie 7–10 dni, a po okresie 2–4 tygodni chwasty wrażliwe zamierają. Środek najskuteczniej zwalcza chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych – od fazy 2 do 4 liści. Chwasty mniej wrażliwe na działanie środka nie są niszczone całkowicie, ale nie stanowią konkurencji dla rośliny uprawnej.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień jary, owies, kukurydza
Substancja aktywna	tritosulfuron 250g/kg; dikamba 500g/kg
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, jasnota różowa, komosa biała, maruna bezwonna, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdest kolankowy, rdest plamisty, rdest powojowy, rumianek pospolity, rumian polny, samosiewy rzepaku, stulicha psia, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa. chwasty średnio wrażliwe, np.: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, mak polny, przetacznik perski, przetacznik polny. chwasty średnio odporne: ostrożeń polny, rdest ptasi. chwasty odporne, np.: chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, perz właściwy.
Dawka	0,2kg/ha
Mieszanki	Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha Nokaut 75 WG 0,2 kg/ha + Apyros 75 WG 0,013 – 0,020 kg/ha + Olbras 88 EC 1l/ha

Paxio Duo 50 EC

Produkt referencyjny Axial 50 EC



Paxio 50 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, stosowanym nalistnie występującym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy A (inhibitory ACCazy). Środek stosować w okresie najwyższej wrażliwości chwastów trawiastych (BBCH chwastów 10–19), tj.: od pojawienia się pierwszego liścia z pochewki liściowej do fazy dziewięciu lub więcej liści, na chwasty aktywnie rosnące i niezakryte przez roślinę uprawną. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieźnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime, żyto, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	pinoksaden 50g/l
Zwalczane chwasty	pszenica ozima jęczmień ozimy, pszenżyto ozime – miotła zbożowa, wyczyniec polny, żyto – miotła zbożowa, pszenica jara, jęczmień jary – owies głuchy, chwastnica jednostronna
Dawka	0,6–0,9l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

Prince Duo 400 SC to środek chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych oraz niektórych dwuliściennych w rzepaku ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Prince 400 SC pobierany jest głównie przez korzenie chwastów. Środek działa na chwasty zarówno przed wschodami jak i po wschodach.

Roślina chroniona	rzepak ozimy
Substancja aktywna	propyzamid 400g/l
Zwalczane chwasty	miotła zbożowa, samosiewy zbóż, gwiazdnica pospolita, przetacznik bluszczokowaty, przytulia czepna (tylko jesienią w dawce 2,1 l/ha), rdest powojowaty
Dawka	1,25–2,1 l/ha

Prince Duo 400 SC

Produkt referencyjny Turbopropyz 400 SC



Pro-Metobro 500 SC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku.

Jest produktem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Najskuteczniej działa na chwasty od fazy ich kietkowania do fazy rozety. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak, uprawy małoobsz. (soja, słonecznik, bobik)
Substancja aktywna	metobromuron 500g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziomnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, przytulia czepna, psianka czarna, rdestówka powojowata (rdest powojowy), rdest plamisty, szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha). Chwasty odporne: chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się
Dawka	2–4 l/ha

Pro-Metobro 500 SC

Produkt referencyjny Proman 500 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Tarracco® 700 SC

Rejestracja własna Rudnikagro



Tarracco® 700 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany dogłębowo i nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy C1. Środek zawiera substancję czynną zaliczaną do inhibitorów fotosyntezy na poziomie fotosystemu II. Pierwsze objawy działania środka to występujące po kilku dniach od zastosowania żółknięcie, widoczne w przestrzeniach międzynerwowych, a także na brzegach i wierzchołkach najstarszych liści. Następnie widoczne jest silne zahamowanie wzrostu i zasychanie rośliny. Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od kiełkowania do fazy liścieni.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak ćwikłowy, burak pastewny
Substancja aktywna	metamitron 700g/l
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, rdest plamisty rumianek pospolity, tasznik pospolity, tobołki polne Chwasty średniowrażliwe: bodziszek drobny, fiołek polny, przytulia czepna
Dawka	1,0 – 1,25l/ha

© Znak zastrzeżony Rudnikagro sp. z o.o.

Triflu-Life



Triflu-Life Selektywny herbicyd o działaniu układowym. Pobierany jest głównie przez liście i szybko przemieszczany w roślinie. Hamuje podział komórek w stożkach wzrostu, wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Objawy działania takie jak przejaśnienia, żółknięcie, nerkozy, a dalej brązowienie liści wrażliwych chwastów występują w ciągu kilku dni. Ciepło i odpowiednia ilość wilgoci w glebie wpływają korzystnie na działanie środka. W czasie suszy lub chłodów środek działa wolniej. Najskuteczniej działa na intensywnie rosnące chwasty od wschodów do początku fazy dwóch liści właściwych.

Roślina chroniona	burak cukrowy, burak pastewny
Substancja aktywna	triflusaluron metylowy 500g/kg
Zwalczane chwasty	Chwasty wrażliwe: jasnota purpurowa, maruna bezwonna, psianka czarna, przytulia czepna, rdest ptasi, rdest plamisty, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, szczyr roczny, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica owłosiona. Chwasty średniowrażliwe: dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, komosa biała, przetacznik perski, rdest powojowaty. Chwasty średnioodporne: fiołek polny, chwasty odporne: toboła rozłożysta.
Dawka	3 x 30g/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Twist 25 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania perzu właściwego i rocznych chwastów jednoliściennych (chwasty prosowate) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy, ziemniaku i pomidorze.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	kukurydza, ziemniak, pomidor
Substancja aktywna	rimsulfuron 250g/kg
Zwalczane chwasty	chwasty wrażliwe: blekot pospolity, bodziszek drobny, chwastnica jednostronna, dymnica pospolita, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, perz właściwy, przytulia czepna, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne. chwasty średnio wrażliwe: fiołek polny, komosa biała, rdest powojowy, wilczomlecz obrotny. chwasty średnioodporne: przetacznik perski.
Dawka	20-60g/ha

Twist 25 WG

Produkt referencyjny Titus 25 WG



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



**Sprawdzona jakość
produktów
i najniższe ceny!**



Odwiedź nasz sklep internetowy, kupuj i oszczędzaj!

www.sklep.rudnikagro.pl

Coxima nematocyd w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC) o działaniu kontaktowym i układowym.

Środek do stosowania przy użyciu samobieźnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	ziemniak zastosowanie małoobszarowe: marchew, pietruszka, seler, pasternak, burak ćwikłowy
Substancja aktywna	fluopyram 400g/l
Zwalczane szkodniki	zwalczane patogeny: mątwik ziemniaczany, mątwik agresywny, guzaki, korzeniak szkodliwy, cysty mątwika marchwiowego, nicienie glebowe rodzaju <i>Trichodorus</i> spp. <i>Tylenchorhynchus</i> spp.
Dawka	0,625l/ha

Coxima

Produkt referencyjny: Velum Prime



Corleone 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania insektów. Na roślinie działa powierzchniowo i węgłbnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2–4 dni od zabiegu.

Roślina chroniona	jabłoń, ziemniak, kapusta głowiasta biała, kukurydza, uprawy małoobsz. (grusza, śliwa, winorośl, kalafior i inne)
Substancja aktywna	chlorantraniliprol 200g/l
Zwalczane szkodniki	owocówka jabłkowieczka, zwójkówki liściowe, stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), tantniś krzyżowiaczek, omacnica prosowianka, owocówka śliwkowieczka, zwójka cyklamenowa (kapuściana), piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
Dawka	50ml–210ml/ha

Corleone 200 SC

Produkt referencyjny Coragen 200 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Cypermetryx 100 EW

Produkt referencyjny: Sherpa 100 EW



Cypermetryx 100 EW Insektycyd w formie emulsji, olej w wodzie (EW), o działaniu kontaktowym i żółdkowym. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna cypermetryna zaliczana jest do grupy 3A. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego (w tym plecakowego).

Roślina chroniona	rzepak ozimy, pszenica ozima, pszenica jara, ziemniak; zastosowanie małoobszarowe: rzepak jary, kapusta głowiasta, kłafior, brokuł, rośliny ozdobne
Substancja aktywna	cypermetryna 100g/l
Zwalczane szkodniki	stodyszek rzepakowy, skrzypionki, mszyce, stonka ziemniaczana, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek i inne
Dawka	0,15–0,3l/ha

Delta 50 EW

Produkt referencyjny: Decis Mega 050 EW



Delta 50 EW jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żółdkowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników gryzących i kłująco-ssących w roślinach rolniczych, sadowniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych, polowych i sadowniczych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień jary, burak cukrowy, ziemniak, rzepak ozimy i jary, jabłoń, śliwa, pomidor, kapusta i inne rośliny warzywne
Substancja aktywna	deltametryna 50 g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca burakowa, pchełka burakowa, drobnica burakowa, śmietka ćwiklanka, mszyce, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, gnatarz rzepakowiec, chowacz brukwiacek, pchełki ziemne, pchełka rzepakowa, stodyszek rzepakowy (zabieg przeciwko stodyszkowi zwalcza również chowacza czterozębego), szkodniki łuszczynowe (pryszczarek kapustnik, chowacz podobnik), mszyca kapuściana, kwieciek jabłkowiec, mszyca jabłoniowa, kwieciek malinowiec, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, mszyca różano – szczeciowa, skoczek różany
Dawka	0,1–0,25l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Emporia 018 EC jest środkiem owadobójczym i przedziorkobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania owadów szkodliwych w uprawie gruszy, truskawki, maliny, jeżyny, obojętnej, ogórka, papryki, pomidora, chryzantemy i róży.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i ręcznych.

Roślina chroniona	grusza, truskawka, malina, jeżyna, obojętnej, ogórek, papryka, pomidor, chryzantema, róża.
Substancja aktywna	abamektyna 18g/l
Zwalczane szkodniki	miodówka gruszoza plamista, przedziorek chmielowiec, wciornastek zachodni, miniarki
Dawka	0,5–1,2l/ha

Emporia 018 EC

Produkt referencyjny Acaramic 018 EC



Filary 100 OD Insektycyd w formie koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie działa głęboko oraz translaminarnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Ostateczny efekt działania widoczny jest po 3–6 dniach od zabiegu. Substancja czynna cyjantraniliprol należy do grupy IRAC 28.

Roślina chroniona	ziemniak, marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy, cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek, kapusta głowiasta biała i czerwona, brokuł, kalafior, kapusta brukselska, truskawka
Substancja aktywna	cyjanotraniliprol 100g/l
Zwalczane szkodniki	stonka ziemniaczana, wciornastki, potyśnica marchwiarka, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, kwiecień malinowiec, śmietka cebulanka, miniarka porówka, światłówka naziemnica, bawełnowka egipska, błyszczka jarzynówka, gnataz rzepakowiec, mączlik warzywny, muszka płomokrzydła
Dawka	125–750ml/ha

Filary 100 OD

Produkt referencyjny Benevia 100 OD



Insektus Duo 500 EC

Produkt referencyjny Cyperkill Max 500 EC



Insektus Duo 500 EC Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień jary, ziemniak, rzepak ozimy, kapusta głowiasta, groch siewny cukrowy uprawiany na strąki, por, uprawy małoobsz (burak cukrowy, burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, len, konopie, bobik, burak pastewny, sałata, brokuł, bób, fasola, kalafior, inne warzywa i rośliny ozdobne)
Substancja aktywna	cypermetryna 500g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca zbożowa, skrzypionki, larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, stódyszek rzepakowy, chowacz podobnik, gąsienice tantnisia krzyżowiaczka, mszyca grochowa, wciornastki, szarek komośnik, tarczyc mglawy, tarczyc złotosmugi, drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, poskrzyпка szparagowa, poskrzyпка dwunastokropkowa, zmieniki, gąsienice zjadające liście, bielonek kapustnik, bielonek rzepnik, błyszczka jarzynówka, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki, chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
Dawka	0,05-0,06l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Marabel 20 SP Miros 20 SP

Produkt referencyjny Mospilan 20 SP



Miros 20 SP i Marabel 20 SP to środki owadobójcze w formie proszku rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczone do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawie ziemniaka, rzepaku ozimego, roślin sadowniczych, warzywnych, ozdobnych, w lasach, w leśnych szkółkach iglastych i liściastych drzew i krzewów, w uprawach leśnych, na plantacjach nasiennej świerka i modrzewia. Na roślinie działa powierzchniowo, węgłnie i systemicznie. Mogą być stosowane przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, ręcznych oraz aparatury agrolotniczej.

Roślina chroniona	ziemniak, rzepak ozimy, rośliny sadownicze, warzywne i ozdobne, lasy i uprawy leśne, plantacje nasienne świerka i modrzewia
Substancja aktywna	acetamipryd 20%
Zwalczane szkodniki	larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej, stódyszek rzepakowy, chowacz podobnik, przyszczaek kapustnik, chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny, gnatarz rzepakowiec, mszyce, toczyk gruszwiaček, owocówka jabłkoweczka, owocnica jabłkowa, przyszczaek jabłoniak, ogrodnica niszczylistka, bawełnica korówka, nasionnica trześniówka, owocnice śliwowe, owocówka śliwkoweczka, opuchlaki, brudnica mniszka, chrabąszcze, zwójki jodłowe, barczatka sosnówka, osnuja gwiaździsta, boreczniki sosnowe, śmietka modrzewiowa, osnuja gwiaździsta, ochojniki, zwójka bukoweczka, zwójka siatkoweczka, zwójka różoweczka i inne zwójki oraz inne młode gąsienice zjadające liście, miódówka gruszowa plamista, miódówka gruszowa czerwona, miódówka gruszowa żółta, śluzownica ciemna, kwiecień grusowiec, przyszczaek gruszwieć, misecznik śliwowy, licinek tarninacek, kwiecień pestkowiec, ogrodnica niszczylistka, przyszczaek borówkowiec, krzywik maliniacek, kwiecień malinowiec, kistnik malinowiec, przyszczaek namalinek todygowy, przeziernik malinowiec, krzywik porzeczkowiec, przyszczaek porzeczkowiak liściowy, owocnica porzeczkowa, przeziernik porzeczkowiec, zmieniki, wciornastek grochowiec, wciornastek tytoniowiec, śmietka kielkówka, śmietka cebulanka, śmietka kapuściana, śmietka gęłbowa, strąkowiec bobowy, strąkowiec grochowy, strąkowiec fasolowy, pchełka burakowa, drobnica burakowa, chowacz szczypiorak, młode gąsienice wgryzki szczypiora, pchełki, skoczogonki, mączlik szklarniowy, wciornastek zachodni, miniarki, krobik modrzewiowiec
Dawka	0,08-0,4kg/ha

Modivo 60 CS Insektycyd w postaci zawiesiny kapsuł do rozcieńczania wodą (CS), o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych. Na roślinie działa powierzchniowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna gamma-cyhalotryna należy do grupy 3A.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary
Substancja aktywna	gamma-cyhalotryna 60g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca zbożowa, skrzypionki, chowacz brukwiacek, słodyszek rzepakowy, chowacz czterozębny
Dawka	50-80ml/ha

Modivo 60 CS

Produkt referencyjny Nexide 60 CS



Insektycyd w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do sporządzania zawiesiny wodnej, o działaniu kontaktowym i żołądkowym oraz jajobójczym, przeznaczony do zwalczania niektórych szkodników gryzących w roślinach warzywnych. Na roślinie działa powierzchniowo i włąębnie. Działanie włąębne dotyczy wyłącznie młodych liści. Środek jest otrzymywany w wyniku fermentacji bakterii *Saccharopolyspora spinosa*. Substancja biologicznie czynna działa na komórki nerwowe owada, co prowadzi do paraliżu, a następnie do śmierci szkodników. Objawy działania środka występują w ciągu kilkunastu minut po zabiegu, śmierć szkodnika następuje po upływie kilku godzin.

Zastosowanie	ziemniak, kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, cebula, por, pomidor, ogórek i uprawy małoobsz. (szpinak, czosnek, jarmuż, sałata, borówka, agrest, porzeczka, grusza i inne)
Substancja aktywna	spinosad 240g/l
Zwalczane szkodniki	larwy stonki ziemniaczanej, bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, piętnówka kapustnica, wciornastek tytoniowiec, wciornastek zachodni, muszka plamoskrzydła, wciornastek ryżówek, zwójka bukóweczka, zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, miniarka ciepłubka, miniarka psiankowianka, miniarka wielozerna i inne
Dawka	0,1l- 0,4l/ha

Picador 240 SC

Produkt referencyjny Spintor 240 SC



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Rovar 20 FU

świeca dymna



Insektycyd o działaniu kontaktowym, żółdkowym i gazowym, w formie generatora dymu, przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych, w których występują szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych, którzy ukończyli szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin metodą fumigacji.

Roślina chroniona

dezynsekcja pustych pomieszczeń magazynowych, silosów zbożowych i paszowych

Substancja aktywna

pirymifos metylowy 225g/kg

Zwalczane szkodniki

szkodniki ziarna, nasion i ich przetworów: wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzel surynamski, kapturnik zbożowiec, omacnica spichrzanka, rozkruszek mączny.

Dawka

1 świeca na 400-500 m3 pomieszczenia

Rovar Bis 500 EC

Produkt referencyjny Actellic 500 EC



Rovar Bis 500 EC to środki owadobójcze w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żółdkowym i gazowym, przeznaczone do dezynsekcji pustych pomieszczeń magazynowych oraz nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji

Zastosowanie

dezynsekcja magazynów i nasion przeznaczonych do konsumpcji

Substancja aktywna

pirymifos metylowy 500 g/l

Zwalczane szkodniki

wołek zbożowy, spichrzel surynamski, trojszyk ulec

Dawka

1l/1000m³; 0,8ml/lit nasion

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Insektycyd w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). W roślinie działa układowo. Środek stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny dla organizmów pożytecznych, spełnia wymogi integrowanej ochrony i integrowanej produkcji. W przypadku roślin ozdobnych, truskawki, bakłażana, pomidora, papryki i ogórka środek dopuszczony do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji, odizolowanej od podłoża.

Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna flupyradifuron zaliczana jest do grupy butenolidów – 4D.

Roślina chroniona	jabłoń, grusza, chmiel, rośliny ozdobne (w uprawie pod osłonami typu szklarnia), uprawy małoobsz. truskawka; bakłażan, pomidor, papryka, ogórek (uprawa w systemie bezglebowym, pod osłonami typu szklarnia)
Substancja aktywna	flupyradifuron 200 g/l
Zwalczane szkodniki	mszyca jabłoniowo-babkowa, mszyca jabłoniowo-zbożowa, mszyce, mączlik szklarniowy, miodówka jabłoniowa, Owocnica jabłkowa, miodówka gruszowa plamista, mszyca śliwowo-chmielowa (wektor wirusa mozaiki chmielu – HpMV), mszyca gruszowo-podbiałowa, mszyca gruszowo – przytuliowa, mszyca ogórkowa, mączliki
Dawka	0,4–0,9l/ha

Sagitta

Produkt referencyjny Sivanto Prime



Insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie (SL), o działaniu kontaktowym i żółdkowym. Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i układowo. Zgodnie z klasyfikacją IRAC substancja czynna acetamipryd zaliczana jest do grupy neonikotynoidów (grupa 4A). W celu ochrony wód gruntowych środków zawierających substancję czynną acetamipryd zastosowanych w uprawie jabłoni w dawce 0,4 l/ha, nie stosować częściej niż co drugi sezon na tym samym obszarze.

Roślina chroniona	ziemniak, rzepak ozimy, rzepak jary, jabłoń
Substancja aktywna	acetamipryd 200g/l
Zwalczane szkodniki	stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze), chowacz brukwiacek, chowacz czterozębny, słodyszek rzepakowy, chowacz podobnik, pryszczarek kapustnik, owocówka jabłkóweczka, mszyca jabłoniowa
Dawka	0,12l– 0,4l/ha

Sombrero 200 SL

Produkt referencyjny Carnadine 200 SL



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Certes 480 SL

Produkt referencyjny Cerone 480 SL



Certes 480 SL jest środkiem z grupy regulatorów wzrostu w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie. Certes 480 SL stosuje się jako środek zapobiegający wyleganiu jęczmienia, żyta, pszenżyta i pszenicy uprawianych na dobrych stanowiskach lub nawożonych wysokimi dawkami azotu. Środek powoduje skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż, co zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od terminu opryskiwania, fazy rozwojowej rośliny uprawnej, zawartości łanu, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Zastosowanie

jęczmień ozimy, żyto, pszenżyto ozime, pszenica ozima, jęczmień jary, pszenica jara

Substancja aktywna

etefon 480 g/l

Dawka

0,75–1,5l/ha

Midas Duo 250 EC

Produkt referencyjny Moddus 250 EC



Midas Duo 250 EC to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Produkt ten stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta, pszenżyta ozimego oraz pszenicy jarej, jęczmienia jarego i owsa siewnego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego. Środek do stosowania przy użyciu opryskiwacza polowego. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu. Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

Zastosowanie

pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, żyto, pszenżyto ozime i owies

Substancja aktywna

trineksapak etylu 250g/l

Dawka

0,3l–0,6l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUVANTY

Stopper Regulator wzrostu i rozwoju roślin w formie płynu do stosowania techniką aerozolowania na gorąco lub zimno, przeznaczony do stosowania w przechowalniach ziemniaka.

Zastosowanie	ziemniak (zapobieganie kiełkowaniu bulw w czasie przechowywania)
Substancja aktywna	1,4-dimetylonaftalen 980g/kg
Dawka	20 ml/1000 kg bulw

Stopper

Produkt referencyjny 1,4Sight



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Goliat Trio 060 FS

Produkt referencyjny Celest Trio 060 FS



Goliat Trio 060 FS jest środkiem grzybobójczym w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczony do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych ziarna siewnego pszenicy ozimej i jarej, jęczmienia ozimego i jarego, pszenżyta ozimego i żyta ozimego w celu zwalczania chorób grzybowych.

Roślina chroniona	pszenica ozima, pszenica jara, żyto ozime, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy i jary
Substancja aktywna	fludioksonil 25 g/l, difenokonazol 25g/l, tebukonazol 10g/l
Zwalczane choroby	zgorzel siewek, pleśń śniegowa zbóż, śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć gładka pszenicy, głownia pyłająca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia, głownia pyłająca jęczmienia, głownia żdźbłowa żyta
Dawka	200ml/100kg ziarna

Retro 170 FS Retro Duo 170 FS

Produkt referencyjny Redigo Pro 170 FS



Retro 170 FS i Retro Duo 170 FS są zaprawami grzybobójczymi w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczonymi do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawieszinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

Roślina chroniona	pszenica ozima i jara, jęczmień ozimy i jary, pszenżyto ozime, żyto ozime, owies
Substancja aktywna	protiokonazol 150 g/l, tebukonazol 20 g/l
Zwalczane choroby	pleśń śniegowa zbóż i traw, pasiastość liści jęczmienia, plamistość siatkowa jęczmienia, zgorzel siewek, głownia pyłająca jęczmienia, głownia pyłająca pszenicy, śnieć cuchnąca pszenicy, głownia żdźbłowa żyta
Dawka	50–66,7ml/100 kg ziarna

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Savea 333 FS to fungicyd w postaci płynnego koncentratu zawiesinowego o działaniu systemicznym, przeznaczony do zaprawiania ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych przed chorobami grzybowymi w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. Fungicyd przeznaczony jest do zwalczania chorób odnasiennych oraz chorób liści.

Roślina chroniona	pszenica ozima, jęczmień ozimy, jęczmień jary
Substancja aktywna	fluksapyroksad 333g/l
Zwalczane choroby	septorioza liści, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia, mączniak prawdziwy zbóż i traw, plamistość siatkowa jęczmienia, pleśń śniegowa, pasiastość liści jęczmienia
Dawka	150ml/100kg ziarna
Mieszanina	jęczmień jary: Savea 333 FS 75 ml + Kinto Duo O80 FS 200 ml / 100 kg ziarna siewnego pozostałe zboża: Savea 333 FS 150 ml + Kinto Duo O80 FS 200 ml/100 kg ziarna siewnego.

Savea 333 FS

Produkt referencyjny Systiva 333 FS



Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.



NASIONA
— ŁAWRENOWICZ —

KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY



WWW.NASIONA-LAWRENOWICZ.PL

Rudnikagro prowadzi skup:

- pszenicy konsumpcyjnej
- pszenicy paszowej
- jęczmienia browarnego
- jęczmienia paszowego
- pszenżyta
- żyta konsumpcyjnego
- żyta paszowego
- kukurydzy
- rzepaku
- owsa
- łubiu
- grochu
- innych surowców

OBRÓT PŁODAMI ROLNYMI

Rudnikagro Sp. z o.o. zajmuje się kompleksową obsługą branży rolnej. Prowadzimy skup zbóż i rzepaku w naszym magazynie, jak również odbieramy towar bezpośrednio od Klienta. Dbamy przy tym, aby transakcje zawierane z naszymi odbiorcami były zawsze ubezpieczone i pewne, co daje gwarancję terminowej zapłaty za dostarczony przez Kontrahenta towar. Jesteśmy sprawdzonym i wiarygodnym partnerem zapewniając naszym klientom nie tylko konkurencyjne ceny, ale też szybki odbiór i sprawną realizację zawartych umów.



Mocne strony współpracy z nami to:

- Gwarancja bezpieczeństwa transakcji
- Krótkie terminy płatności
- Szybka realizacja umów
- Terminowe płatności
- Profesjonalne doradztwo



Informacje na temat skupu, bieżących cen, notowań:

Sebastian Lebiecki
mob. +48 781 900 045
email: s.lebiecki@rudnikagro.pl

NASIONA ZBÓŻ, KUKURYDZY, RZEPAKU I INNYCH ROŚLIN ROLNICZYCH

Rudnikagro oferuje kwalifikowany materiał siewny zbóż, rzepaku i kukurydzy większości liderów branży nasiennej. Dostarczamy najbardziej popularne odmiany w konkurencyjnych cenach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów oferujemy również nasiona mieszanek traw i nasion rolniczych, takich jak tulin, bobik, groch i inne.



Kontakt z działem nasion:

Sebastian Lebiecki
Tel. 781 900 045
email: s.lebiecki@rudnikagro.pl

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

MATERIAŁ SIEWNY

NAWOZY

ADIUWANTY

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Odbiorców, wprowadziliśmy do naszego portfolio nawozy zawierające fosfor i potas z mikroelementami, produkowane przez koncern ICL, opierające się na naturalnych surowcach. Nawozy PK cieszą się coraz większą popularnością na polskim rynku, dlatego zapraszamy do zapoznania się z nimi na kolejnych stronach Katalogu.

W naszej stałej ofercie znajdziecie Państwo nawozy azotowe, wieloskładnikowe i inne, krajowych jak i zagranicznych producentów. Dbamy, aby nasi dostawcy poznawali specyfikę Państwa upraw, tak aby móc Państwu przedstawić indywidualny program nawożenia roślin. Precyzyjne nawożenie wspomaga rozwój roślin i pozwala na duże oszczędności, dlatego wprowadziliśmy do naszej oferty nawozy otoczkowane CRF Agrostart Mini o przedłużonym działaniu, produkcji ICL.

Bardzo ważnym elementem zrównoważonego planu nawożenia jest oczywiście regularne wapnowanie. Aby rośliny w pełni przyswoiły zaaplikowane nawozy, wymagana jest regulacja pH gleby. Dzięki wysokiej jakości wapna węglanowego, pochodzącego od niemieckiego producenta Wesling, utrzymanie właściwego pH jest dużo łatwiejsze.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi nowościami przygotowanymi na sezon 2022, oraz do kontaktu z przedstawicielami terenowymi.



Kontakt z działem nawozów:

Mariusz Rudnicki

Tel. 532 088 333

email: m.rudnicki@rudnikagro.pl

TRACEGROW

grow with us



NAWOZY DOLISTNE PREMIUM

ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ prawdziwie ekologiczne nawozy wytwarzane z metali po recyklingu

Nawozy dolistne Tracegrow Premium

ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ to kompleksowe i innowacyjne nawozy dolistne, mające zastosowanie w każdej uprawie. Uzupełniają niedobór mikroelementów, zwiększają wigor roślin, podnoszą jakość i wysokość plonów. Zawarte w nich cynk, mangan i miedź wpływają na bardziej efektywne wykorzystanie nawozów NPK i zapewniają zrównoważone odżywianie.

Korzyści i funkcje

- Mangan wzmacnia odporność roślin na przymrozki.
- Miedź, zawarta w ZMC-Grow, podnosi plony, szczególnie owsa i jęczmienia.
- Skuteczność w rolnictwie konwencjonalnym, jak i ekologicznym.
- Produkty zrównoważone, produkowane z surowców o zerowej emisji CO2.
- Doskonale przyswajalny, może być łączony ze środkami ochrony roślin i innymi preparatami AGRO.
- 100% formy siarczanowej, najdogodniejszej dla roślin.
- Bezproblemowa aplikacja, ponieważ produkty ZM-Grow™ oraz ZMC-Grow™ nie blokują dysz rozpylających



ZM-GROW™

Całkowita średnia zawartość składników pokarmowych:
Cynk 60 g / l (4,4%)
Mangan 67 g / l (4,9%)
Siarka 75 g / l (5,5%)
pH 3,9
Gęstość 1,36 kg / l

Dawka: 2-3 l / ha na 200-400 l wody

Produkty nawozowe ZM-Grow™ i ZMC-Grow™ są dopuszczone do upraw ekologicznych w UE i są zgodne z rozporządzeniem Komisji Europejskiej (WE) nr 2018/848.

Technologia Tracegrow jest opatentowana, a produkcja jest zgodna z normami ISO 9001 i 14001. Technologia Tracegrow zdobyła wiele nagród, w tym nagrodę Firwaste Fińskiego Instytutu Ochrony Środowiska.

ZMC-GROW™

Całkowita średnia zawartość składników pokarmowych:
Cynk 58 g / l (4,1%)
Mangan 62 g / l (4,4%)
Miedź 27 g / l (1,9%)
Siarka 90 g / l (6,1%)
pH 3,8
Gęstość 1,40 kg / l



Folcrop Combi to nawóz mikroelementowy skompleksowany ligninosulfonianami, do stosowania dolistnego, fertygacji oraz w uprawach hydroponicznych. Dzięki zastosowaniu ligninosulfonianów działanie produktu jest efektywne i delikatne dla upraw. Duża zawartość żelaza poprawia produkcję chlorofilu i wzrost roślin. Do stosowania we wszystkich uprawach zarówno rolniczych jak i ogrodniczych wymagających szybkiego uzupełnienia mikroelementów. Jest dobrym dyspergatorem i środkiem zwilżającym stosowanym w połączeniu z innymi produktami.

Zastosowanie	zboża, kukurydza, rzepak i inne uprawy rolnicze i ogrodnicze
Skład	B – 3.8 g/l, Cu – 1.5 g/l, Fe – 51.4 g/l, Mn – 25.6 g/l, Mo – 1 g/l, Zn – 6.4 g/l, czynnik kompleksujący ligninosulfoniany
Dawka	2–3 l/ha

Folcrop Combi



Folcrop Gold 10-14-4 szybko przyswajalny nawóz NPK do stosowania dolistnego wzbogacony o mikroelementy i aminokwasy. Jest to silnie pobudzający i antystresowy produkt, który zwiększa plony i poprawia jakość plonu.

Zastosowanie	zboża, kukurydza, soja, słonecznik, fasola, sorgo
Skład	N – 103.6 g/l, P2O5 – 142.4 g/l, K2O – 38.8 g/l, MgO – 3.8 g/l, B – 1.4 g/l, Mn – 9.7 g/l, Zn – 6.7 g/l, wolne aminokwasy – 106.1 g/l
Dawka	1–3 l/ha

Folcrop Gold 10-14-4



Lebosol®-Bor

nawóz WE



Lebosol®-Bor można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do mieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napętnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Bor powinien zostać dodany jako ostatni.

Etanolamina boru

Zawartość składników: 11% boru rozpuszczalnego w wodzie, odpowiednio 150 g/l B

Gęstość: 1,36 kg/l

Wartość pH: 7,9 – 8,1

Uprawa	Dawkowanie
Zboża	1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha lub 3x0,75 l/ha Od 3 liści oraz od początku strzelanie w źdźbło do fazy kłoszenia
Rzepak	1-2 x 1,0 – 2,0 l/ha jesienią od stadium czwartego liścia do kwitnienia
Kukurydza	1-2 x 1,2 l/ha w stadium 6 – 8 liścia
Ziemniak	1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 6 liścia do zwierania rzędów
Burak	1-2 x 1,0-2,0 l/ha od 4-6 liścia do zamykania międzyrzędzi

Lebosol Cynk 700 SC



Lebosol Cynk 700 SC to dolistny nawóz specjalistyczny stosowany w uprawie kukurydzy, ziemniaka, warzyw strączkowych, owoców pestkowych, jagodowych i innych uprawach. Cynk jest ważnym składnikiem pokarmowym, ponieważ odpowiada za syntezę białek i poprawia efektywność nawożenia azotowego. Ponadto, cynk zwiększa odporność roślin na suszę, niskie temperatury, choroby oraz warunki stresowe. Dzięki temu ułatwia i ulepsza proces wzrostu a także wpływa na jakość i wysokość plonu.

Zawartość składników: 40% cynku jako tlenku cynku (700g/l Zn)

Gęstość: 1,75kg/l

Wartość pH: 8-9

Uprawa	Dawkowanie
Truskawka	0,5-1l/ha
Jagodowe	0,5l/ha
Owoce ziarnkowe	4 x 0,25l/ha
Owoce pestkowe	2-3 x 0,25l/ha
Winogrona	1 x 1l/ha
Warzywa i rośliny strączkowe	0,5-1,0l/ha
Zboża, kukurydza, ziemniak	0,5-1,0l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Lebosol®-Mangan-Nitrat 235 to nawóz manganowy w formie roztworu.

Azotan manganu:

15 % manganu rozpuszczalnego w wodzie (235 g/l Mn);
7,7 % azotu całkowitego jako azotu azotanowego (120 g/l N)
Zawartość składników: 15 % Mn (235 g/l), 7,7 % N (120 g/l)
Gęstość: 1,55 kg/l
Wartość pH: 0 – 1

Substancja czynna produktu i jej działanie:

Dostępność manganu jest niska na glebach o dużej zawartości próchnicy, na glebach piaszczystych i lekkich/luźnych, na glebach o wysokiej wartości pH, jak również podczas chłódów i wysokiej wilgotności.

Niedobór manganu uwidacznia się przez żółknięcie liści, występowanie czarnych punktów na liściach oraz obecność jasnozielonego marmurka pomiędzy głównymi nerwami liści. Gorsza jest również jakość produktów, np. zła jakość skórki u ziemniaków.

Lebosol®-Mangan-Nitrat 235

nawóz WE



Uprawa	Cel	Dawkowanie
Zboża	Odporność na mróz, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 l/ha jesienią od stadium 3 liści.
	Poprawa plonu, odporność na złamanie, zaopatrzenie w pierwiastki śladowe	1 – 2 l/ha wiosną, od początku wegetacji do fazy liścia flagowego.
Rzepak	Odporność, na mróz, zwiększenie odporności, poprawa plonu, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha jesienią od fazy 4 liści do fazy 6 liści.
Buraki cukrowe	Odporność, poprawa plonu, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha pomiędzy fazą 6 liści a zwieraniem się rzędów.
Ziemniaki	Zmniejszenie podatności na zarażenie parchem	1 l/ha dodatkowo do zaprawiania.
	Jakość skórki owocu, odporność, zaopatrzenie w mangan	1 – 2 –krotnie 2 l/ha od początku zwierania się rzędów.
Dla wszystkich roślin użytkowych	Zaopatrzenie w mangan	Przy nawożeniu dolistnym – 1-2 l / ha w minimum 200 l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,25 – 0,5 %. Kilkakrotne zastosowanie małych ilości produktu zwiększa efektywność.
Truskawki, Rośliny jagodowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	2 l/ha od początku kwitnienia aż do zbiorów.
Owoce ziarnkowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	Stosować kilkakrotnie 1 l/ha od końca fazy kwitnienia (u odmian podatnych na ordzawienia od fazy gdy owoc osiąga wielkość 40mm (faza orzecha włoskiego)).
	Zielona barwa zasadnicza skórki	Trzykrotnie 1 l/ha po czerwcowym opadaniu owoców
Owoce pestkowe	Jakość liści, zaopatrzenie w mangan	2-3 aplikacje w ilości 1 l/ha od fazy zawiązywania owoców aż do zbiorów.
Warzywa psiankowe, dyniowate i strączkowe, Warzywa kapustne, liściowe i cebulowe, Warzywa korzeniowe, rzepowate i wieloletnie	Jakość liści, wybarwienie liści, odporność, zaopatrzenie w mangan	1 – 2-krotnie 2 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca ilość masy liściowej

Lebosol Miedź 350SC

nawóz WE



Lebosol®-Kupfer350 SC można mieszać z powszechnie stosowanymi środkami ochrony roślin. Ze względu na to, że w praktyce nie można przewidzieć wszystkich oddziaływań, które mogą wystąpić, zaleca się wykonanie próby mieszalności na małej ilości produktów przewidzianych do zmieszania razem. Mieszając produkt z nawozami dolistnymi lub środkami ochrony roślin należy napętnić opryskiwacz wodą do 2/3 jego objętości następnie osobno dodać produkty. Lebosol®-Kupfer350 SC powinien zostać dodany jako ostatni. Ciecz przeznaczoną do oprysku należy nieustannie mieszać i niezwłocznie zużyć.

Tlenochlorek miedzi

Zawartość składników: 24,2 % Miedzi odpowiednio 350 g/l Cu

Gęstość: 1,36 kg/l

Wartość pH: 7,9 – 8,1

Uprawa	Dawkowanie
Zboża	0,25 – 0,75 l/ha od fazy 3 liści do fazy końca krzewienia
Kukurydza	2 – 3 l/ha jesienią od fazy 4 do 6 liści
Winogrona winne	Stosować kilkakrotnie 0,25 – 0,75 l/ha od fazy 3 liścia do fazy gdy większość jagód styka się ze sobą
Dla wszystkich roślin	Przy nawożeniu dolistnym 0,25 – 0,75 l/ha w 200 – 400 l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,05 – 0,2 %

Lebosol Molibden



Lebosol®-Molybden to nawóz molibdenowy w formie roztworu.

15,6% molibdenu rozpuszczonego w wodzie (210 g/l Mo)

Zawartość składników: 15,6% Mo (210 g/l)

Gęstość: 1,37 kg/l

Wartość pH: 7,6

Wielkość opakowania: 1l

Substancja czynna produktu i jej działanie:

Dostępność molibdenu jest niska w glebach lekkich i kwaśnych (torfowe gleby piaszczyste, gleby z torfowisk wysokich, gleby ogrodnicze i substraty) oraz podczas suszy.

Niedobór molibdenu uwidacznia się głównie na liściach młodszych, ale również przez chlorozy liści starszych. Na brzegach liści występują nerkozy, liście zwijają się, powierzchnia blaszki liściowej jest ograniczona, częściowo tylko z rosnącym nerwem środkowym (beczkowatość liści). Głównie obserwuje się ograniczony wzrost roślin, jaśniejszą barwę liści oraz objawy ich więdnienia. Róże kalfiora są zniekształcone i skręcone.

Uprawa	Cel	Dawkowanie
Dla wszystkich roślin użytkowych	Zaopatrzenie w molibden	Przy nawożeniu dolistnym 0,25 l/ha wco najmniej 200l wody. Przy aplikacji opryskiwaczem plecakowym roztwór 0,05 – 0,1%
Warzywa kapustne, liściowe i cebulowe	Zapobieganie zanikowi liści sercowych oraz beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	1–2-krotnie 0,25 l/ha gdy rozwinięta jest wystarczająca ilość masy liściowej
Rzepak	Zapobieganie beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	1–2-krotnie 0,25 l/ha o początku strzelania w źdźbło
Buraki cukrowe	Zapobieganie zanikowi liści sercowych oraz beczkowatości, zaopatrzenie w molibden	0,25 l/ha pomiędzy fazą 6 liści a zwieraniem się rzędów

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY



Agromaster® Start Mini 21-21-5

Niezawodny nawóz startowy

Kluczowe korzyści:

- Połączenie zaawansowanej technologii otoczkowania ICL ze specjalnie dobranymi mikrogranulkami sprawia, że Agromaster Start Mini jest bezpiecznym nawozem startowym dla wszystkich roślin uprawnych.
- Dzięki kontrolowanemu uwalnianiu N i P, Agromaster Start Mini odżywia rośliny już w pierwszych stadiach rozwoju wegetatywnego bez negatywnego wpływu na proces kiełkowania i wschodów.
- Poprzez swój sposób aplikacji (w sąsiedztwie nasion) przyspiesza ukorzenianie się roślin i sprzyja ich szybkiemu rozwojowi.



Kontakt w Polsce: nawozy@icl-group.com
www.icl-group.com





ICLPK^{plus}  16-30
Polysulphate^{inside}



Zrównoważone
nawożenie

PKpluS 16-30

PKpluS 16-30 – zawiera wiele pierwiastków, które umożliwiają rolnikom maksymalizację efektywności wykorzystania składników odżywczych.



Dlaczego warto stosować ICL PKpluS?


- Cechą wyróżniającą nawozy PKpluS jest mieszanina dwóch form potasu: chlorkowego oraz siarczanowego.
- Znaczna część zawartości potasu i magnezu jest w postaci siarczanów (od 20% do 35%), co pozwala na elastyczne stosowanie w wielu uprawach.
- Bardzo wysoka rozpuszczalność P i K (powyżej 95%).
- Przy intensywnym nawożeniu azotowym siarka, będąca składnikiem nawozu, wspomaga jego przemiany w roślinie.
- Pięć składników w jednym nawozie: fosfor, potas, magnez, siarka i wapń podczas jednej aplikacji.

Efekty działania PKpluS zostały potwierdzone doświadczeniami prowadzonymi w wielu uprawach

Roślina/Odmiana: Pszenica ozima | EUFORIA w 2021
Lokalizacja: Polska | SDOO Radostowo, woj. pomorskie
Badane parametry: Plon całkowity

Zastosowane nawozy

Jesień	Kontrola	kg/ha	ICL	kg/ha
	Superfosfat potrójny (40%)	150	PKpluS 16-30	400
	Sól potasowa (60%)	100		
Wiosna	Saletra amonowa	600	Saletra amonowa	600
	Sól potasowa (60%)	100		



Nova PeKacid



Nova PeKacid jest nawozem fosforowo-potasowym, poprawiającym przyswajanie składników pokarmowych i może być stosowany do oczyszczania instalacji w opryskiwaczu.

1. Dzięki działaniu zakwaszającemu (pH 1% roztworu wynosi 2,2) PeKacid korzystnie wpływa na dostępność składników pokarmowych – makro- i mikroelementów dostępnych w glebie oraz podnosi stopień ich wykorzystania przez rośliny.
2. Skutecznie ogranicza powstawanie wapiennych osadów w opryskiwaczu, co obniża koszty jego konserwacji i przedłuża czas użytkowania.
3. Dostarcza fosfor i potas.

Azot całkowity (N)	0%
Pięciotlenek fosforu (P_2O_5)	60%
Rozpuszczalne w wodzie	26,2%
Tlenek potasu (K_2O)	20%
Rozpuszczalne w wodzie	16,6%

Dawkowanie

Nawożenie dolistne od 1,0 do 2,0 kg/ha w zależności od uprawy i fazy rozwojowej rośliny.

Asanti

Produkt referencyjny: Asahi SL



Asanti jest regulatorem wzrostu i biostymulatorem, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asanti ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami. Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Zastosowanie

Uprawy: rośliny sadownicze (jabłoń, wiśnia, porzeczka czarna, malina, truskawka), rośliny warzywne (marchew, pomidor, ogórek, pszenica, burak, rzepak, kukurydza, ziemniak, słonecznik, Uprawy małoobszarowe: rośliny sadownicze (agrest, aronia, borówka, czereśnia, grusza, śliwa), rośliny warzywne (brokuł, burak ćwikłowy, cebula, cukinia, papryka, seler, pietruszka

Skład

para-nitrofenolan sodu – 3 g/l (0,3%),
orto-nitrofenolan sodu – 2 g/l (0,2%),
5-nitrogwajakolan sodu – 1 g/l (0,1%)

Dawka

3 x 0,5l/ha

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

Kaishi jest produktem zawierającym aminokwasy wytworzone w procesie hydrolizy enzymatycznej białek pochodzenia wyłącznie roślinnego.

Kaishi jest zalecany szczególnie do stosowania po okresach stresu (np. zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury, wymoknięcia, susza, zasolenie, grad), lub podczas kluczowych i wymagających stadiów rozwojowych roślin uprawnych.

Produkt jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Wolne L-aminokwasy zawarte w Kaishi stymulują procesy metaboliczne w roślinie, które ulegają zachwianiu w sytuacjach stresowych dla roślin.

Po zastosowaniu Kaishi rośliny łatwiej przechodzą okresy stresowe i szybciej się regenerują, ponieważ L-aminokwasy wpływają korzystnie na fotosyntezę, wzmocnienie ścian komórkowych i pracę aparatów szparkowych.

Ponadto niektóre aminokwasy (L-prolina, L-metionina, L-tryptofan) poprawiają kondycję roślin i korzystnie wpływają na ich rozwój gdyż są prekursorami fitohormonów i substancji wzrostowych

Zastosowanie	rzepak, zboża, kukurydza, burak, ziemniak, warzywa z siewu i rozsady, drzewa owocowe
Skład	L-aminokwasy 13%, azot organiczny 2,1%, azot całkowity 2,1%
Dawka	3 x 1,5–2,0 l/ha

Kaishi



Supraza^{NPK} to unikatowy, kompleksowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom **azot (N)**, **fosfor (P)** i **potas (K)**, promując ich wzrost przy jednoczesnej regeneracji i rewitalizacji gleby.

SUPRAZA^{NPK} zalecana jest do wszystkich rodzajów upraw rolniczych, ogrodnich i sadowniczych, na wszystkich rodzajach gleb.

Supraza NPK



Zawartość:	SUPRAZA^{NPK} zawiera Mikrobiom troficzny®, którego zastrzeżony skład mikrobiologiczny bezkonkurencyjnie wpływa na wzrost i rozwój roślin. Azotobacter chroococcum GBR AS ≥ 8–9 × 10⁹ posiada status biopromotora w uprawach pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, prosa i wyki oraz roślin oleistych i okopowych. Azospirillum brasilense GBR AB ≥ 5–7 × 10⁸ ma zdolność wpływania na wzrost roślin uprawnych poprzez produkowanie różnych hormonów i do efektywnego wiązania azotu. Herbaspirillum seropedicae GBR HS ≥ 4–5 × 10⁸ wiąże azot atmosferyczny poprzez wewnętrzną symbiozę z roślinami uprawnymi, u roślin strączkowych intensyfikuje nodulację, a w zbożach dostępność fosforu. Bacillus megaterium GBR BM ≥ 3–6 × 10⁸ bakterie pobudzające wzrost roślin oraz odporność na choroby, zwiększają przyswajalność fosforu i częściowo potasu. Frateuria aurantia GBR FA ≥ 2–3 × 10⁸ wpływa na zwiększenie biomasy oraz zawartość chlorofilu, powoduje wzrost przyswajalnej formy potasu (K) w glebie.
Dawka	Zawartość dobrze wymieszać i stopniowo wlewać do opryskiwacza napełnionego do 3/4 wodą przy włączonym mieszadło. Uzupełnić wodą do wymaganej ilości wody na hektar. Wykonać oprysk.

W TROSCE O TWOJE UPRAWY - BIOPREPARATY, ADIUWANTY

Stosowanie adiuwantów to:

- poprawienie i zwiększenie aktywności preparatów ochrony roślin
- zmniejszenie ilości i kosztów użytych preparatów ochrony roślin

Zadaniem adiuwantów jest poprawienie własności cieczy użytkowej podczas zabiegów ochrony roślin. Można wyróżnić adiuwanty (wspomagacze) syntetyczne, biologiczne i mineralne. Posiadają one różne własności i są zalecane do stosowania z różnymi grupami środków ochrony roślin.

ADIUWANTY:

OLBRAS 88 EC[®]

OLMAKS 92 EC

EFECTAN 650 SL

T-Fungin 75 SL



Pest-Aut[®]



Środek do MYCIA i NEUTRALIZACJI
pozostałości pestycydów
w opryskiwaczach.

SUPRAZA^{NPK}
biopreparat

SUPRAZA^{NPK} to unikatowy, kompleksowy biopreparat skomponowany ze szczepów mikroorganizmów, które działając w środowisku dostarczają roślinom azot (N), fosfor (P) i potas (K), promując ich wzrost przy jednoczesnej regeneracji i rewitalizacji gleby.

**AZOT
Z POWIETRZA**

NOWOŚĆ!
kompleksowy
preparat

Twój partner i doradca

OBROL[®]

www.adiuwanty.pl
www.supraza.pl
www.obrol.pl

OBROL Kulczyński Sp. j.
Kruszewnia, ul. Spółdzielcza 3a
62-020 Swarzędz
tel. 61 817 30 68, fax 61 818 15 23
e-mail: biuro@obrol.pl

SPOSÓB DZIAŁANIA: Pangaea Booster™ jest adiuwantem w postaci koncentratu do sporządzenia emulsji wodnej, przeznaczonym do stosowania w mieszaninie (tank-mix) ze środkami owadobójczymi opartymi na pyretroidach. Pangaea Booster™ jest szczególnie skuteczny przeciwko opornym populacjom szkodników, w przypadku których same pyretroidy wykazują słabsze działanie np. stodyszka rzepakowego (*Meligethes aeneus/pollen beetle*). Pangaea Booster™ skutecznie wspomaga zwalczanie szczerpów chrząszczy wykazujących mechanizmy odporności metabolicznej.

Pangaea Booster™ zawiera piperonylobutoksyd: 87,5%

Należy zastosować maksymalnie 330 ml **Pangaea Booster™** na hektar.

Pangaea Booster



Uprawa	Dawka	
Jabłoń, grusza	300 ml na 200 l wody – maksymalne stężenie (0,2%)	Stosować do momentu, gdy owoce osiągną wielkość 5–10 mm, włącznie
Morela, wiśnia, brzoskwinia, nektarynka, śliwa		Stosować do momentu pojawienia się pierwszych owoców, włącznie.
Winorośl, malina	Optymalna dawka produktu: 300 ml/ha.	Stosować do momentu pojawienia się pierwszych owoców, włącznie.
Truskawka		Stosować do momentu rozwoju pierwszych owoców, włącznie.
Porzeczka (czarna i czerwona)		Stosować do momentu pojawienia się pierwszych zielonych zawiązków, włącznie.
Ogórek, bakłażan, melon, papryka, dynia		Stosować do momentu pojawienia się pierwszych owoców, włącznie.
Pomidor		Stosować do momentu pojawienia się pierwszych owoców na pierwszym gronie, włącznie.
Bób, fasola, groch		Stosować do momentu pojawienia się pierwszych strąków, włącznie.
Burak cukrowy, burak ćwikłowy		Stosować do fazy, gdy 6–ty liść będzie w pełni rozwinięty, włącznie.
Rzepak		Stosować do fazy, gdy 10% łuszczyn osiągnęło typową wielkość, włącznie.
Len uprawiany na nasiona		Stosować do momentu, gdy 10% torebek nasiennych osiągnęło ostateczną wielkość, włącznie
Chmiel		Stosować do momentu rozwoju szyszek, włącznie.
Zboża		Stosować do fazy, gdy odstania się 20% kwiatostanu, włącznie.
Kukurydza uprawiana na paszę		Stosować do fazy, gdy widoczny jest wierzchołek wiechy, włącznie.
Brukselka		Stosować do fazy początku rozwoju pąków bocznych, włącznie.
Ziemniak		Stosować do fazy początku zawiązywania bulw, włącznie.
Kalaflor, brokuł		Stosować do fazy początku rozwoju główki, szerokość wierzchołka >1 cm, włącznie.
Odmiany sałat główkowych		Stosować do fazy, gdy zaczynają się tworzyć główki, włącznie.
Odmiany sałat liściowych, szpinak		Stosować do fazy, gdy rozeta liściowa osiągnęła 30% średnicy typowej dla odmiany, włącznie.
Marchew, rzepa, pasternak		Stosować do fazy rozwiniętego 9–go liścia, włącznie.
Cebula		Stosować do fazy wyraźnie widocznego 9–go liścia, włącznie
Soja		Koniec kwitnienia: widoczne pierwsze strąki (ok. 5 mm długości)

TecnoPhyt pH+



TecnoPhyt Ph+ to płynny nawóz przeznaczony do aplikacji dolistnej, zawierający azot i fosfor i działający jako surfaktant, regulator i wskaźnik pH, adiuwant i przeciwpianiacz.

Podnosi aktywność i efektywność środków ochrony roślin i innych nawozów.

TecnoPhyt pH+ jest zalecany do wszystkich rodzajów upraw: rolniczych, ogrodniczych i sadowniczych.

Zawartość składników pokarmowych:

Fosfor (P₂O₅) 15% W/W, azot całkowity 3% W/W, azot w postaci mocznika 3% W/W

Adiuwant/wspomagacz/surfaktant

Zmniejsza napięcie powierzchniowe cieczy (roztworu roboczego) gwarantując bardziej jednolite rozproszczenie roztworu dając efekt zwilżenia. Napięcie powierzchniowe kropli (wynik przyciągania między cząsteczkami wody) działa jako bariera dla idealnego rozproszczenia roztworu na powierzchni liścia. Dodanie TecnoPhyt pH+ redukuje napięcie powierzchniowe z 72 dyn/cm² do 35-40 dyn/cm² przez co zwiększa się przyswajalność roztworu i jego zdolność do przyklejania się do blaszki liścia.

Aktywator i przeciwpianiacz

Przyspiesza pracę pompy protonowej w roślinie, która transportując jony H⁺, zwiększa pobór cieczy do wnętrza rośliny jak również uaktywnia komórki roślin do wytworzenia większej energii i absorpcji cieczy całą swoją powierzchnią. Redukuje pianę w roztworach cieczy roboczych z nawozami i pestycydami.

Regulator i wskaźnik pH

TecnoPhyt pH+ zmniejsza negatywny i dezaktywujący wpływ twardej wody (o wysokiej zawartości kationów wapnia, magnezu i żelaza) na działanie środków ochrony roślin.

TecnoPhyt pH+ zawiera w swojej formule wskaźnik pH, który zmienia kolor roztworu na różne odcienie czerwieni i żółci w zależności od poziomu kwasowości i zasadowości, wskazując optymalny poziom pH wody w granicach 4,5-5,5 kolorem jasnoczerwonym.

FUNGICYDY

HERBICYDY

INSEKTYCYDY

REGULATORY
WZROSTU

ZAPRAWY

ZBOŻA

NAWOZY

ADIUWANTY

UBEZPIECZENIA

Oferujemy fachową i kompleksową usługę w zakresie ubezpieczeń rolnych, maszyn, budynków i budowli, surowców rolnych w trakcie przechowywania oraz OC przedsiębiorstw rolnych, zarówno osób prawnych jak i gospodarstw indywidualnych.

Uprawy rolne

do 65% dopłaty do składki z budżetu państwa
odpowiedzialność już od 8%

OCHRONA OD:

- wymarznięcia, ognia
- przymrozków wiosennych,
- gradu, deszczu nawalnego, huraganu

Maszyny rolnicze

- bardzo szeroki zakres ubezpieczeń
- ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, w tym od kradzieży i zniszczenia,
- umowy krótkoterminowe, roczne i wieloletnie
- od ognia i innych zdarzeń losowych
- Agro Casco

Budynki i OC

- budynki i budowle od ognia i innych zdarzeń losowych
- silosy
- magazyny płaskie
- wagi najazdowe itp.
- towary w magazynach (ziemiopłody)

Osoba do kontaktu:

Monika Zielińska, tel. 532 409 999, e-mail: mzielinska@madez.pl



Oferta AGROFIRMA może obejmować ubezpieczenie:

a) Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych:

wariant Basic

- deszcz nawalny,
- grad,
- huk ponaddźwiękowy,
- huragan,
- lawina,
- osunięcie się ziemi,
- pożar,
- uderzenie pioruna,
- upadek statku powietrznego,
- trzęsienie ziemi,
- wybuch,
- zapadanie się ziemi

wariant Standard

zdarzenia z wariantu Basic
i dodatkowo:

- dym i sadza,
- napór śniegu,
- powódź,
- spływ wód po zboczach,
- uderzenie pojazdu,
- upadek dźwigu,
- drzewa,
- masztu,
- komina,
- słupa,
- anteny lub innych budowli
albo ich części,
- zalanie

b) mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

c) sprzętu elektronicznego

d) odpowiedzialności cywilnej (w tym m.in. odpowiedzialność za szkody w środowisku)

e) utraty dochodu

Główne zalety ubezpieczenia:

- a) solidna likwidacja szkód,
- b) ubezpieczysz słomę, siano i trawy energetyczne składowane w budynkach,
- c) atrakcyjny system zniżek – oszczędzisz nawet do 30% składki,
- d) ochroną obejmiesz nawet swoje zwierzęta gospodarskie – nie tylko od ognia i innych zdarzeń losowych, ale również od porażenia prądem,



DZIAŁ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN:

Mateusz Świątek, tel. 781 600 023, e-mail: m.swiatek@rudnikagro.pl

Rafał Lis, tel. 781 600 022, e-mail: r.lis@rudnikagro.pl

Roman Ragin, tel. 535 500 612, e-mail: r.ragin@rudnikagro.pl

DZIAŁ NAWOZÓW:

Mariusz Rudnicki, tel. 532 088 333, e-mail: m.rudnicki@rudnikagro.pl

DZIAŁ NASION I ZBÓŻ:

Sebastian Lebiecki, tel. 781 900 045, e-mail: s.lebiecki@rudnikagro.pl

DZIAŁ UBEZPIECZEŃ:

Monika Zielińska, tel. 532 409 999, e-mail: mzielinska@madez.pl

STRONA INTERNETOWA FIRMY:

www.rudnikagro.pl

SKLEP INTERNETOWY:

www.sklep.rudnikagro.pl

Siedziba firmy:

Rudnikagro Sp. z o.o.

ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin

tel. (+48) 91 461 25 64

fax. (+48) 91 460 03 50

e-mail: info@rudnikagro.pl

Oddział Lipiany

ul. Myśliborska 5a

74-240 Lipiany

tel. (+48) 91 579 31 61

fax. (+48) 91 564 53 06

Oddział Pyrzyce

ul. Stargardzka 8

74-200 Pyrzyce

tel./fax. (+48) 91 831 41 58

Oddział Banie

ul. Dworcowa 1

74-110 Banie

tel. (+48) 91 416 63 32

fax. (+48) 91 416 64 09

